

K250. 41

1

5b

私たちの科学 5

植物はどのようにして
生きているか

中学校第1学年用




文部省

私たちの科学5

植物はどのようにして 生きているか

中学校第1学年用





土を使わないで、小石のところに養分を流して野菜を育てる農場。
東京より約15マイルの調布にあり、世界最大のもの。232,000平方メートル。
(上)外から見た温室。(中)その内部のトマト。(下)野天に作ったところ。前方のタンクから養分の液をポンプでとこにそそぐ。(本文51ページをごらんください。) PHOTO BY U. S. ARMY SIGNAL CORPS



文部省

もくろく

まえがき	2
問題 1. 植物はどのように運動しているか	5
問題 2. 植物はどのようにして大きくなっているか	22
問題 ③ 植物は でんぶん や さとう をどこで作るか	32
問題 4. 植物はどのように こきゅう をしているか	44
問題 5. 植物はどのようにして水と養分を取りいれるか	50
問題 6. 緑色のない植物はどこから養分を取ってくるか	61
問題 7. 植物はどのようにしてふえるか	72
問題 8. どのようにして良い作物を作りだすか	86
問題 9. 植物はどのような類に分けられるか	91



「植物はどのようにして生きているか」を研究する前に、次の間に答えてごらんなさい。

- あなたもいろいろな動物も、口から食物をとって生きています。草や木は何もたべなくても生きていられるのでしょうか。何かをとっているとすると、一たいどこから、どのようにして取り入れているのでしょうか。
- 日本では、バクテリア(細菌)やカビを食料にしているといって、外國人はめずらしがります。どんな食料のことでしょう。
- 土がなければ、野菜は作れないものでしょうか。
- あなたも動物も いき をしています。草や木は いき をしなくても生きていられるのでしょうか。
- 花のはたらきを知っていますか。
- こい肥料をやると、作物がいじけたり、かれたりするのはどういうわけでしょうか。
- 種のないスイカはできないでしょうか。





まえがき

日本アルプスへ登った時のことです。お花畠には、白や黄やもも色のきれいな花がさきほこっていました。3,000mの高さのあるこのあたりでは、土用だというのになんという気持ちのいい気候でしょう。ちょうど春のおひがんのようでした。まだ、あちらこちらにたくさん雪が残っていました。雪とはいっても春のあわ雪とはちがってかたくしまったザラザラの氷のつぶの集りです。一面の雪の表は、うろこの形にくぼみがならんで、その一つ一つの片すみにはいいあわしたように黒い土が残っていました。私は山の見張りをしているおじいさんと2人で、お花畠の中を歩きながら話をしました。

おじいさんは、この高山植物が、考えのたりない山登りの人たちにぬき取られないように、見張りをしているのです。「一ぱんよくあらされるのはなんだい。」「コマクサだね。もうここらじやさがさなきやめっからねえだよ。20年も前にや、ここいら一面にあっただが。何かの薬になるずら、いつかはこ一ぱい取っているやつがいただ」「薬にはなるまいが、か

わいいからな」角ばった小石のザクザクしている河原のような山の斜面でコマクサにちょいちょい出あいます。ふくらとした、もも色の花が弱々しいくきにさえられています。河原のような小石の斜面は、寒さも風もきびしいところです。ここで花がさくまでには、そうとうの年月きびしい気候とたたかってこなくてはならなかつたでしょう。高山植物には、夏、花がさいて秋に実を結び、種を残してかれてしまう1年きりのものはまれで、小さくてもたいていなん年も生きのびてきた根を持っています。それを一時のなぐさみでぬき取ってしまうのは、かわいそうです。また、ふえる力の弱いものですから、あらされると、きれいなお花畠はもうだれにも楽しめなくなってしまうでしょう。

「じいさん、こんなのは持っていないかい」といって、岩についたカサカサした地衣を見せました。「こりゃ取ってもいいだよ。」そりゃおかしいね。高山植物の採集を禁ずと書いてあるじゃないか。」「こりゃ植物じゃねえだよ。」「じゃ動物かい。」「ばからしい。」「じゃ石か。」「石でもねえようだな。」「一たい生き物なのか、生き物でないのかい。」「さあ」「さあはこまるね。生き物と生き物でないものとのとちゅうがあっちゃ。しかし、生き物の死がいは生き物のうちにしておくんだよ。」わかっている。——石



イスタンドゴケ

じゃねえようだから、生き物だな。そうすりゃ植物かも知れねえ」「心細いね、かも知れねえって。植物だよ。りっぱに、高山植物さ。きみが見張っている物だよ」「へえ、これで植物かね。なるほど。いい学問をしただ」

日本アルプスのお花畠で、2人はこんのんきな話をしながら、それぞれに別の心で、世の中のものを生物と無生物に分け、生物を動物と植物に分けて考えていました。

イヌやネコはもちろん、ミミズも自分で動くから生き物だということはたれもあやしません。自分で動くのを見ると、たしかに生き生きしている感じがします。草や木になると風に動かされることはあっても自分で動かないから、動物ほどに生きている感じがしません。草や木は動いていないでしょうか。草や木は土に根をおろしているから、場所を自由に変えることはできませんが、芽や花や葉などは、それぞれ自分につごうのよいほうへ動いています。ただ、たいへんゆっくり動くために、私たちに気づかないのです。高速度さつえいの反対に、ゆっくり さつえい したフィルムをふつうの速さで写して見る えい画 の方法があります。このような えい画 で芽や花などの動き方を見ると、まるでこれらに心があって、光を求めてのびていったり、たがいに先を争って花を開いたりするように見えます。植物も生きている感じがありありとします。植物はどのようにして生きているか研究しましょう。



問題1. 植物はどのように運動しているか



(1) オジギソウの葉の運動

あなたはオジギソウを作ったことがありますか。種さえ手に入れることができたら、作るのはやさしいですからぜひやってごらんなさい。毛ば立った まり のようなもも色のかわいららしい花ができます。花もよいが、それよりも はね のように切れた葉はもっとおもしろいものです。

この葉は「私は、はにかみやさんです」という 花ことば を持っています。それはなぜでしょう。まあたましに、その葉にさわってごらんなさい。たちまちに、その葉をとじます。いま、一ぱん先の小さな葉にそっとさわったとしますと、その葉とそれに向きあった葉がとじます。それからだんだんに遠くの葉がとじていきます。さわり方が強いほど遠くのほうまでとじていきます。
小さな葉が十い
オジギソウ



く対か集まって1本のじくについて1まいのはねの形になっています。このじくの元に節(第二の節)があります。このじくについている葉が全部とじてしまうと、次にはこの節のところからじくがたれ下がります。さわり方が強いと、このじくがたれたあとでそのとなりのじくの葉がとじるようになります。第二の節についたじくが全部下がったのち、葉のえが一ばん元の節(第一の節)からたれ下がります。まずだいたいこののような運動をするわけですが、くわしいことは、じっさいにやってみて、観察してご覧なさい。

1. さわる強さをいろいろ変えて、
 - (1) 小さな葉のどこまでとじていくか。
 - (2) どんな順序にとじるか。
 - (3) とじた葉がまた開くまでの時間。
 - (4) どんな順序に開くか。
2. さわる場所をいろいろ変えて実験してみる。
3. さわる道具をいろいろ変えて実験してみる。
 - (1) 指でさわる。
 - (2) はりでさわる。
 - (3) 水をさわらせてみる。
 - (4) そのほかのものでさわってみる。
4. じかにさわらないで、空気をあてるとか、熱い物を近づけるとかして、葉をとじるかどうかを見る。
まだほかにもいろいろな方法が考えられることでしょう。

いろいろにやってみて、オジギソウはーたいどんなものに感じるのか研究してご覧なさい。

葉のとじ方が進んでいくあたりは、まるで動物のように神経があるのではないかと思うほどです。しかしあもしろいことには、動物と同じに、エーテルのガスで感じなくなることです。どんな感じ方が似ていても、植物には動物にあるような神経という特別のすじは見つかりません。しかし、一ぼうのはしで感じたものをなれた他のはしに早く伝えているのです。全体の葉のえと小さな葉をついているじくと小さな葉とに分けて考えてみると、葉のえの運動が一ばん大きく、これは第一の節で起ります。この節をしらべてみましょう。この図のように、葉のえのつけねの下側がふくれてあります。葉のえが上がったり下がったりするためには、ちょうど人のうでの関節のようにはたらくところがいるわけです。えのつけね オジギソウの葉の関節がこの関節になっております。ふくれたところはやわらかで、水分がたくさんあります。葉にさわると、それがここまで傳わってくるものとみえます。そして、関節の下側の水分が急に減って、しおれたようになると葉が下へ下がるのです。このしあげをはっきりわかるには、ここを切って、けんび鏡で研究することもだいじなことになってくるのです。




だいたい、植物のからだの中の組立てがどんなになっているかということは、問題2で研究することにしましょう。ここではっきりさせておかなくてはならない点は、植物は感覚があるような運動をしても、動物や人に見られるような、感覚を傳える神経を持っていないことです。

(2) モウセンゴケの葉の運動

モウセンゴケを見たことがありますか。これは運動のろい植物だというのに、空を自由に飛ぶことのできる虫をとてたべようとするのですから、たれでもおもしろがって世話ををするはずです。小さなすやき(素焼)のはちにミズゴケなどをつめて、その上にモウセンゴケを植え込み、水をたっぷりやっておきます。そうするとおもしろい生活が見られるだけでなく、かわいらしい小さな花も楽しめます。

ミズゴケは日本本州では高い山、北海道では平地にあるジクジクしたところにはえているコケで、からだの中に水をたくさんすいこみますからカイメンのように水をふくませる用に役だります。花たゞや花わを作の時や、根のついた植物を遠くへ送る時などに、根元にミズゴケをまきつけて水をふくませて



モウセンゴケ



ミズゴケ


おきますと、動かしても水がこぼれないで、しかも切り花が長くもつのです。

モウセンゴケはなぜこのように変わった育て方をするのでしょうか。植物はできるだけ、その育っている場所と同じようにして育てるとうまくいくからです。動物でも植物でも、自分のすんでいる場所に最もつごうのよいはたらきを持っています。また、いい方を変えると、自分のすみよい場所をみつけて、そこにすみついているのだともいえます。

さて、モウセンゴケの葉の運動ですが、正しくいうと、モウセンゴケの葉にある毛の運動ということになります。

モウセンゴケの葉は、しゃもじ形をしていて、キラキラ光るつゆの玉をさえたはりが一面につきまさっているようなかっこうです。英語で sun-dew (太陽のつゆ)というのは、この形からつけた美しい名だと思います。太陽に照らさ

れた時、にじの色にかがやくつゆをごらんなさい。たれでもこれがすきになるでしょう。しかし、この美しいつゆが虫をとておさえ、これをとかす液であるとは虫も気がつかないとみえます。ここでまちがえないように気をつけてもらいたいことがあります。それは、私たちに美しく見えるもの



モウセンゴケの1まいの葉

が、そのまま虫にも美しく見えると考えてはならないことです。私たちに見えたり感じたりすることが、虫にはどのように見えたり感じたりするかは、別に研究したうえでなくてははっきりといえないことです。

多くの場合ハイよりも小形で、ハイに似た形をした虫がとらえられています。虫が飛んできて、この葉にとまると、このつゆはとりもちのようにねばっこくて、虫をはなしません。このつゆをいただいたはりはすぐに運動をはじめ、しゃもじの内側にまがります。そして、虫をとてあさえたような形になります。葉から出てくる液で、虫のからだをゆっくりととかします。とけてしまうと、はりはまた元のようを開いて、次の虫を待ちます。このようにして、この植物は肉を食物にしているわけです。しかし、肉がなければ全く生きていけないものではなく、一部はふつうの緑色の植物のように、自分で養分をつくるはたらきもしています(問題3.をごらんなさい)。

それはともかく、このはりのような毛の運動は、だいぶん動物の運動に近い感じがするでしょう。

(3) ハイジゴクの葉の運動

ハイジゴクは北アメリカに野生しているのですが、日本では植物園やほうぼうの温室でよくみられます。モウセンゴケよりずっと大きな葉を持っています。この葉は長いえの先にうちわを2まいに折りまげてつけた形をしています。


葉のへりには、とげがのこぎりの目のようにならんでいます。葉の左右両半分の内側には3本ずつによく感じる毛があって、葉のへりのとげは、ちょうど両手の指を組みあわしたようにガッチャリとかみあってしまいます。虫をはさむ運動の早いこととたしかなこととはちょうどろくほどです。

(4) サギゴケのめしへの先の運動

めしへやおしへの一部が、さわった時運動するものにはいろいろあります。

ハイジゴクの中で、サギゴケは雑草としてふつうに見られるものですから、庭や田のあぜや道ばたでさがして、しらべてごらん下さい。下の図のような形で、春、うすむらさき色の花がさきます。めしへの先が上下2まいに分かれています。これをはりの先でさわってごらんなさい。急に口をとじるようになります。

これまでに記した植物の運動は、かなり早く動くので、動物の運動のような感じがします。これらは、オジギソウの関節と同じように、まがる部分の水が多くなったり、少なくなったりするために起ります。いま、



ハイジゴク




サギゴケ

まがる部分を左右両半分に分けて考えてみましょう。左側が張りきって、右側がしおれると、右側へまがることになります。

(5) つるの運動

ヘチマ・カボチャ・キュウリなどのつるがよくまきつくことは、よく知っています。しかし、どれくらいの速さでまきつくか見た人は少ないと思います。あんがい速くまき



カボチャの つる

くのにおどろくことでしょ
う。これらのつるが長くの
びて空中でフラフラしている
のを見つけて、指なり竹なり
をこれにふれて、ジッと見て
いてごらんなさい。数分のう
ちにまがりはじめます。


これらのつるは、物がさわるとそれにこたえて動きはじめるのです。この時は、物にふれている外側のほうののび方(長さの成長)が、ふれている側ののび方より大きいのです。その結果、物にふれているほうへまがることになるのです。このように両側の成長のちがいによって起る運動は、このほかいろいろの場合に見ることができます。ヘチマ・カボチャ・キュウリのようなウリ類のつるは、エンドウのつると似たところがあります。これらはアサガオやクズのつるとはちがったところがあります。ただ、どちらもほかのもの

にまきつかなくては、自分のからだをささえられないことは同じです。アサガオ・クズではくきそのものが物にまきついて登っていきます。だから、くきがのびるだけはどこまでもまきながら高く上がれます。クズが高い木の上まで上がっているのをよく見かけます。しかし、カボチャのつるはくきからえだ分かれして出た短いものですから、そのつるのとどく近いところにあるものだけがささえになるにすぎません。くきそのものがほかの木にまきついて登ることはないのです。それがためカボチャを屋根にはさせようとすると屋根にとどくまでよく世話ををしてやらないと上がりません。

実験 11 同じふとさの ぼちで、つるのまきつく速さを
しらべてごらんなさい。晝と夜とでどんなにちがうか。氣
温とどんな関係があるか。

また、次のようなことも研究してみるとおもしろいでしょ
う。つるはどれくらいのふとさのものにまきつくか。あまり
ふとくても細くともまかないでしょ。また、つるは、どれ
くらいかたむいているものにはまきつくか。まっすぐに立っ
ているものにまくことはわかっていますが、だんだんかたむ
いてくるとどうでしょ。これはアサガオやクズのよう
なくきのまきつくつるでやってごらんなさい。

つるの先はゆっくりと、円をえがいてまわる運動をしてい



つるの先の動き方
時計のはりのようにまわっているものは右まきになります。

(6) 花が開いたり、とじたりする運動

アサガオやハスの花が夜明けに開いて、日中にとじ、マツバボタンやタンボボは晝間だけ開いていて、日がくれるととじます。



スイレンの花
こくに開くからヒツジグサといったのだそうです。そうキチッと2時には開きません。品種によっても開く時に早いおそいはありますか、だいたい夕方6時ごろにはとじます。オシロイバナは同じく午後かなりおそく開いて、夜は開いています。マツヨイグサ・ツキミソ


ます。ちょうどくらがりで、天井からぶら下がっている電燈をさがす人の手つきに似た運動です。この運動をしているから、その間に物にぶつかることができます。ぶつかればそれにまきつくのです。この円をえがく運動の方向に二通りあるわけですね。図のように左まわりをしているものが物にまきつる

くと左まきになります。この反対に、

ウ・ユウガオが日ぐれにさくことはよく知っているでしょう。このように、花によって開いたりとじたりする時こくのだいたいきまっているものがあります。それで、これを使って時こくを知る花時計にするのもおもしろいことです。このように、あるきまったく時こくに花が開いたりとじたりするのは、光の強さや温度の変化によるものが多いのです。チューリップ・クロッカスの花は、タンボボ・マツバボタンの花のようになん回も開いたりとじたりをくりかえします。この運動は花びらの内側が外側より早くのびると開き、反対に外側が内側より早くのびるととじることになります。どんな花でも、すべてこの成長のちがいで開くのではありませんが、多くの場合、成長によって開く運動を起します。(イネの花の開くのは成長ではありません)。また、開く運動の原因が光であるか熱であるかは、なかなかきめにくくむずかしい問題なのです。しかし、アサガオのはちを井戸につるしておくとおそらく開くとか、水く開いていたとかいう自由研究がありました。このように、どんな場合にはどんなに変わったかを研究してみるにはおもしろい問題ですからやってごらんなさい。

(7) 芽や葉が日のほうにまがる運動

実験2. ダイコンやトウモロコシの種をはちにまいて、まどのそばにおきます。芽が出たら芽がどちらに向くかごらんなさい。



ダイコンの芽ばえ

子葉の数に 2まいのと 1まいのがあります。ダイコンでは 2まい、トウモロコシでは 1まいです。子葉を 2まい持っているものをそら子葉類、1まいのを單子葉類といっています(問題 9.92 ページをごらんなさい)。花のさく植物をこの二つに大きく分けることができます。

單子葉類には、イネ・ムギ・タケ・シロ・ヤシ・ユリ・アヤメ・ラン・ショウガ・サトイモなどがあります。

そら子葉類には、サクラ・バラ・キク・オミナエシ・キュウリ・ナス・ジャガイモ・アサガオ・カブ・ニンジンなどがあります。

ゆか下で芽を出したマメやジャガイモの芽がヒヨロヒヨロと長くのびて光の来るほうへ向かっていているのを見つけることがよくあります。これも、植物が早く光をあびる場所へ出るのにつごうのよい性質です。さて、暗いところと明かるいところで、くきののび方がどれくらいちがうのかをはっきりさせましょう。

トウモロコシの芽ばえ



くきは光のくるほうに向いていき、葉はそれと直角のほうに向きます。この性質は、向日性といって、葉が光をたくさんにあびるのにぐあいのよいものであることがわかります。

種から出たはじめての葉は子葉であって、そのあとで出る本葉とは形がちがいます。

実験 3. エンドウ・アズキ・ダイズなどのうち、どれか一つをえらびます。その種を 5・6つぶずつ分けて、二つのはちにまきます。明かるいところで育てた芽が、暗いところで育てたものとどんなにちがうかごらんなさい。

光のないところでは、種は芽を出しますが、くきはヒヨロヒヨロとのびて、葉が大きくなりません。葉もくきも黄色か白で、緑色ができません。

このちがいのうちで、暗いところのほうが明かるいところよりくきがよくのびるということが、くきのまがる運動に関係があります。

いま、図の A のように芽がまっすぐに出ていたとします。光がやのようなほうからさしてくると、左半分のほうが右半分よりも明かるいから、右側が左側よりもよくのびます。そのため、くきは左のほうへまがることになります。



暗がりでのびたジャガイモの芽

(8) 根が下のほうへまがる運動

まめもやし
暗いところと明かるいところの芽

実験 4. ソラマメかエンドウの種を、たくさんはちにまいておきます。はちの中には、土を入れてもよいですが、のこぎりくず(おがくず)を水でたっぷりしめしたもののほうがうまくいきます。数日たって、根が 3cm ほどにのびた時に、種をそっとぬき出して、根のまっすぐになびたのだけを使って、次のようにします。


- (1) 上とは別のはちに、根を水平にして植え変える。
- (2) マメにピンをつきさして、根が水平になるように木ぎれにとめる。このまま空氣中におくと、根がひからびるから、それを防ぐため、何かガラスの器を上からかぶせます。ガラスの内側にしめた綿か、すい取紙をはりつけておくとうまくいきます。
- (1) は 2・3 時間ののちか、あくる日にほり出して、根のまがり方をしらべます。(2) は、すぐ続けて、ガラスごとにまがり方をしらべてごらんなさい。

どちらの場合にも、水平にしておいた根の先は、下のほうへまがります。根のこの性質は向地性といって、根が土にはいっていくのにつごうのよいものだといえます。このようにまがるのは、重力のために、水平にした根の上半分と下半分ののび方にちがいができるためです。

(9) 根が水のほうへまがる運動

実験 5. 次の図のようにはこにすなを入れ、一ぱう

のはしによせてソラマメかエンドウの根の出たものを植えます(前の実験でしたくしたようなもの)。他のほうのはしによせて、水を入れたすやきのはちをいけます。(底のあなはせんをしておく。)



根は水のほうへ向かってのびる

いく日かのちにほり出して、根のまがり方やえだ根の出方をしらべてごらんなさい。


空氣中でも、根はしめり氣の多いほうへまがる運動をするのを見ることは、できないことはないのですが、ちょっとやり方がむずかしくなるから、ここではやめておきます。

このように、根がしめり氣の多いほうへまがる性質もまた、根が水をすい上げるのにつごうのよいものだということができます。

(10) 自由に泳ぎまわる運動

いよいよ植物の運動の最後のものにはいってきました。これこそ動物の運動と区別をつけることの全くできない運動です。しかし、けんぴ鏡の助けをかりないと見えない世界のできごとです。その中でも一ぱん大きくて、見なれると虫めがねでも見える程度のものに、ミドリムシといいうのがあります。池やスイレンのはちや金魚ばちなどの水の中を泳いでいる

ます。それらの水を けんび鏡 の下において、さがしてみてください。次の図のような形で 1 本の毛を持っていて、緑色をしています。赤い目のようなものが一つあります。からだは、のばしたりちぢめたり、また、冷たい時はまるまっていたりします。



ミドリムシ コレラキン 腸チフスキノ しょう化バクテリア
(約 300 倍) いろいろの バクテリア (約 300 倍)

バクテリア(細きん)の中には、運動をするものとしないものとがあります。運動をするもののうち、私たちの生活と関係の深いものをあげてみましょう。コレラキンは 1 本の毛を持っていますが、腸チフスキノは、からだのまわりをとりまいてたくさんの毛を持っています。これらの毛をゆり動かして水の中をさかんに泳ぎまわっております。しょう化バクテリア(硝化バクテリア)は 1 本の毛を持ち、地中にいて、ちっ素肥料を作つて植物にあたえてくれます。

このほかにも植物が子をつくる時にだけ出すものには泳ぐものがたくさんあります。しかしどれも けんび鏡 の助けをかりなくては見えません。それで けんび鏡 が発明されてから、だんだんに自由に動く植物のあることがはっきりわかつ

てきました。こうなると、むかしの人が考えたように、生物のうち自由に動くものが動物で、自由に動かないものが植物だという動物と植物との区別は、通用しなくなつたわけです。少なくとも けんび鏡 で見える世界では全く通りません。^{*}



次の間に答えてごらんなさい。

次の文のうち、まちがっているところを消してごらんなさい。

1. 世の中にあるものは生物と生物でないものと、そのさちゅうのものとに分けられる。
2. (1) 生物のうち、動くものが動物で、動かないものが植物 ~~植物~~ とは限られない。
(2) 生物は動くか動かないかだけでは区別ができる。
(3) 植物 ~~植物~~ も自由に動くものがある。
3. (1) 植物の動くのは、神経と関係がない。
(2) 植物には神経があって、いろいろなことを感じる。
4. (1) 植物の運動には成長によって起るものがある。
(2) レオジギノウの葉にさわるととじるのは成長による。
5. (1) 芽やくきや根は、下のほうへまがつてのびる。
(2) 芽やくきや根は光の来るほうへまがつてのびる。

* 植物は綠の色素を持ち、動物は持っていない。また、植物の 細ほうには 細ほうまくがあり、動物にはありません。しかし、このどちらも例外なしに動植物を区別する点にはなりません。



問題 2. 植物はどのようにして大きくなっているか



(1) 人の子と竹の子

あなたたちは、いま一生のうちで一ぱんよく育つ年ごろになっています。久しぶりに出あった人から、「やあ、大きくなつたな。まるで竹の子のようじゃないか」といわれたことがあるでしょう。そのように、竹の子は早くのびるもの代表にされております。竹やぶで竹の子をほって食用にしようとする時には、竹の子の頭が土をやぶって出はじめたら、毎日のび方に気をくばっていないと大きくなりすぎます。ことしなど賣りに出ていた竹の子は、「こりゃ竹の子とはいえない。まるで竹じゃないか」とこぼすほど大きくなっていました。


これは大きくなれば目方もふえることを商賣に悪く應用したものです。このように大きくなることには、長さの成長と重さの成長とがあります。

みなさんの成長のようすを知る時にも、測りやすい身長や体重をめやすにしております。次の図は、あなたたちの身長の成



竹の子

長を示したもので、このような成長曲線を、竹の子やそのほかの植物で作ってみると、長さの成長のようすがよくわかります。



煙のカボチャやスイカが大きくなつたと思う時には、その体積をおもに考えているでしょう。このように、体積の成長を見た時にはたいせつなことですが、測ろうとするといへんむずかしい場合が多いのです。それで、成長の程度を測る時には、長さ・重さ・体積のどれか測りやすいものをとりあげているのにすぎません。たいがいは、この三つがいつも一緒にあって成長は起っております。

からだが大きくなるには、からだに新しいものができないではありません。もちを焼いた時に大きくなるのは、外から新しいものがはいるのではなくて、おもに中にあった水が水じょう氣になったからです。また、金物を熱して大きくなるのもけっして新しいものがつけ加わったのではないでしょう。成長はこの金物やもちの大きくなるのとはちがいます。成長を起すために、はいってくる物はどこから来るでしょう。竹の子を作るための竹やぶには、そうとうたくさんのかやしを冬の間に入れておかないと、大きい竹の子はできません。このかやしは根にすわれて、竹の子のからだの一部になったのです。(あたえたかやしばかりで作物のからだ全部ができると考えてはなりません。この点はあとの問題5.でくわしく研究することにしましょう。) あなたたちの場合

には、たべ物がただ一つのたよりです。それで、たべ物が悪いと十分に成長しません。このように、竹の子でも人の子でも、大きくなるには養分がだいじな條件の一つです。

養分さえよければどこまでも大きくなるかというと、そうはいきません。竹の子にはどんなにたくさんのこやしをやっても、10mか15mまでのびれば親のタケになって、それ以上にはのびません。前の身長の成長曲線で、20才ころから先では曲線が水平になるのは、同じことを示しているものです。このように、どこまでも大きくなれない性質は、親ゆずりのものです。この親ゆずりの性質を変えることはできませんが、育て方が悪いと、親ゆずりの性質を十分にのばすことができません。親ゆずりのいろいろな性質のうちで、成長は育て方でたいへんにちがってくるものですから、気をつけなくてはなりません。

(2) 植物の成長と光・温度


植物の成長には、光・温度・養分・水がたいせつなはたらきをしております。光については前に述べましたが、光がないと、くきの長さののび方は早くなるけれども、「葉がのびない」「緑色にならない」「一部が黄色になって大部分が白くなる」「からだがやわらかくなる」など、親の形とはまるで変わったものになります。

この性質を活用したのが、野菜のもやし作りです。ウド・ミツバ・もやし(マメ)・セラリー・アスパラガスなどを白くやわらかく長く作る時に、光にあ

てないようにして芽を出させるのです。木の白いところを長く作る時は、根に土を深くきせるのも同じことです。

温度は成長にたいへん関係の深いものです。熱帯地方は、寒帶地方にくらべると草木の育つのがいちじるしく早いものです。これはおもに温度が草木の成長につごうがよいからです。春から夏にかけて草木がよくのび、秋から冬にかけて成長がほとんど止まってしまうのも温度のためです。成長につごうのよい温度は、植物の種類によってちがってあります。

熱帯の植物を東京に持ってきて育てるのには、冬は温室に入れなければ成長はしません。また、寒帶の植物を熱帯へ移しても、うまく育たないです。植物には、それぞれの種類によって成長するのに最もつごうのよい温度があります。この温度からだんだん高くなるほど成長は悪くなります。そして、暑いほうでも冷たいほうでも、あまりはしのほうでは全く成長が止まってしまいます。この成長と温度との関係を曲線で表わしてみると、だいたい富士山のような山形になります。次に植物の成長の最低温度・最適温度・最高温度の例をあげてみましょう。だいたいに、熱帯地方が植物の成長に適しているのは、温度が高いだけではありません。もし雨が少なくて水がたりなければ、さばくになって、植物はあまり成長




植物の成長と温度の関係曲線

植物の成長の温度				植物と水の関係
種類	最低温度°C	最適温度°C	最高温度°C	
コムギ	0~5	29	42	については、私は
トウモロコシ	9	34	46	たちの科学2.
トウナス	14	34	46	「水はどのように
コウボ	0~6	28~34	34~40	大切か」を参考になさい。
アオカビ	15	25~27	31~36	
クロカビ	7~10	33~37	40~43	
イネ	8~10	30	45	

養分については、上に述べたことのほかは、問題4.で述べることにしましょう。

(3) 根や芽の先の成長

実験1. 問題1.の実験に記したようなソラマメ・エンドウのまっすぐな根を使って、根の先の部分はどんなにのびるかを測ってご覧なさい。ソラマメの根のまっすぐにのびたのをえらび、根がすい直になるようにマメをピンで木ぎれにとめておきます。細いふでかペンで、根の先から1mmごとにしるしをつけます。根がしおれないように、何かでおおっておきます。次の日に出して、根がどのようにのびたかしらべてご覧なさい。




ソラマメの根の成長について、しらべてご覧なさい。

同じような実験を、トウモロコシ・ヒマワリ・エンドウなどの地上に出た部分について、しらべてご覧なさい。

しなくなります。

根は先から3~4mmあたりが最もよくのびます。そこから上のほうにいくにつれて、のび方が少なくなっています。上のほうはもう成長のさかんな時を通り過ぎているのですが、成長のさかんな部分は先へ先へと新しくできることがわかるでしょう。根ののびていくしかけは、この先の数ミリメートルの中にかくされているにちがいないのです。

この数ミリメートルの間を切って、けんぴ鏡で見ることにしましょう。右の図は根の先のたてに切ったところです。



根の先のたての断面

実験2. ソラマメの根の先をよこやたてに、かみそりでうすく切り、けんぴ鏡で根の中の構造を見てご覧なさい。

根をたてにうすく切ることは、よこ(輪切り)に切るよりむずかしいものです。また切ったままのものでは、中の構造がはっきりしませんから、けんぴ鏡用のひょうほんになっているものを、先生からかりてしらべてご覧なさい。


(4) 細ぼうとそのふえ方

根の中には、丸いものや四角なものがかさなっていたり、また多角形になっていたりします。形はいろいろ変わったのがありますが、ともかくへやのような区かくのあるもの

の集りからできていることはわかるでしょう。

その一つ一つのへやのようなものを細ほう(細胞)といいます。植物のからだはどこも細ほうから組み立てられております。からだが大きくなるためには、細ほうの数がふえなくてはなりません。細ほうの数がふえるには、一つの細ほうの中に新しくしきりができて、二つの細ほうになります。このように細ほうが分かれて、数がふえるのは、古くなった細ほうでは行われません。新しい若い細ほうに限るのです。根では、先の近くにある細ほうだけが分かれ、数を増しております。

細ほうの数がふえただけでは、まだ大きくなりません。へやの中にいくらしきりを作っても、小へやの数はふえますが、ぜんたいの廣さはふえないのと同じことです。



細ほうの数がふえたあとで、すぐ続いてそれぞれの体積が

大きくなっています。新しくできた細ほうの一つ一つが大きくなりますと、それが全部あわさって、外から見える根の成長になるわけです。根の外側にしるしせつけてのび方をはかった時に、よくのびた部分は、細ほうの大きくなっている部分なのです。



成長した一つの細ほう

細ほうまく　一ぱん外側にあるまく。
原形質　流動体で、おもにたんぱく質からなり、生きている。
かく　原形質の一部がにくなったところ、ふつう一つある。

実験3. いろいろなものについて 細ほうを けんび鏡でしらべてごらんなさい。細ほうの見やすいものには、タマネギの白いところのうす皮・アオミドロ、ソラマメの葉のうらのうす皮などがあります。

(5) くきとみきの成長

芽や、そのほか地上にある部分がどんなふうに成長するかは、観察によってある程度わかったでしょう。芽ややわらかいくきの成長は、根のように先のところだけに限りません。もっと廣いはんいでのびております。しかし、やわらかいみずみずしいところがよくのびてあります。

竹の子やトウモロコシ・イネ・ムギのような節のあるものでは、若いくきの先だけではなく、節と節との間で節のす

ぐ上のやわらかい部分ものびてあります。この類のものは、のびる成長がさかんですが、くきのふとさを増す成長は、早く止まってしまいます。竹の子の大きくなるのを見ても、このことがわかるでしょう。

ところが、マツやスギやキリのような木は、年々にみきがふります。これは、木の皮をはいでみると、みずみずしい木のはだが出てきますが、この部分の細ほうが若くて数をふやしているからです。この新しい細ほうを作るはたらきは、春から夏にかけてはさかんですが、秋から冬になるとだんだんおとろえます。また、できる細ほうの大きさも春夏は大きく、秋冬は小さいです。木のみきをよこに切ってみると、いくつも輪が見えます。これは、上に述べた季節によって細ほうのでき方がちがう結果を示しているのです。年ごとに一つづつ輪ができるから年輪といって、この数でそのみきの年を知ることができます。年輪のはばは、その年の気候によっても変わります。たとえば、雨の多い年とか、かわいた年とか、その時の気候が成長につごうがよかつたか悪かったかを知ることができます。

木のみきをたてに切った時には、この年輪がたてのすじになって現われます。板や柱のもく目というのはこれです。

まるたから板を切りとる時には、次のページの図のような線にそって切ります。中央の線にそって切ると、平行なもく目が現われて、これをまさめといいます。中心をはずれた線にそって切ると、みだれた目が現われて、これを板

目といいます。ペニア板といって、うすい板を3まいはり合わせたものがあります。もく目のたてとよこを、たがいちがいにはりあわせてありますから、うすくともくるいにうい板になります。家具やかべ・天井板など、使いみちの多いものです。

ペニア板にはり合わせるうす板をまるたから切り取るには、まるたの中心をじくにしてまわしながら、はばの廣いはばで、皮をむくようなくらいにけりとります。だから、つぎ目のない廣い板ができるわけです。



木材の切り方



次の間に答えてごらんなさい。

1. 次の文の正しいほうにしるしをつけてごらんなさい。
○養分が多いといくらでも成長する。
- 養分が多くても成長には限りがある。
2. 次のものは植物の成長にどんな関係がありますか。
○ 温度・光・養分
3. 成長は細ほうのふえ方とどんな関係がありますか。
4. 年輪は木の成長とどんな関係がありますか。
5. 次の文のうち、正しいほうにしるしをつけてごらんなさい。マメの根は(先のほう・先から数ミリメートル上のほう)がよくのびる。
6. タケ・イネのくきはどこがのびますか。



問題 3. 植物はでんぶんや
さとうをどこで作るか

(1) 人や動物はたべ物をどこから得るか

まず、私たちがたべているものについて考えてごらんなさい。私たちは米や小麦をごはんにしてたべます。野菜をたべます。どれも、いうまでもなく植物です。牛肉・豚肉・鳥肉・魚類・牛にゅう・たまごなどをとります。これらはすべて動物からとったものです。この動物たちのたべているものを考えてみましょう。ウシは草やムギなどをたべ、ニワトリはぬかやふすまなどをたべ、その結果、自分のからだの肉を作り、牛にゅうやたまごを出します。魚の中には、自分よりも弱い小魚をたべるものがありますが、このたべられる小魚は そう類(藻類)や小さな動物をたべて生きています。だから、人や動物のたべているものを、元へ元へとさかのぼってみると、かならず植物に行きつくるのです。それでは、動物の元になる植物は何をたべて生きているのでしょうか。この問題は、動物の場合ほどかんたんにかたづかないのです。

「何をどれだけ食べたらよいのか」で、たべ物の成分のうち、炭水化物・しほう・たんぱく質はたいせつな要素であることを知りました。動物のたべている物についても同じことです。

炭水化物は、私たちの主食である米・むぎ・いもなどの中では、でんぶんとしてふくまれております。また、炭水化物

の一つであるさとうも、私たちのだいじなたべ物です。私たちのたべ物のみなもとをさぐろうとする時、まず、だいじなでんぶんとさとうが、どこで、どのようにして作られるかを研究しましょう。

(2) でんぶんやさとうをどこからとるか

でんぶんもさとうも植物からとっています。でんぶん・さとうをふくんでいるものを思い出してみましょう。

食品名	植物体中のある場所	食品名	植物体中のある場所
こめ	実(大部分は種)	くず粉	根
こむぎ	実()	かたくり粉	いも(ジャガイモ)
おおむぎ	実()	えんどう	種
とうもろこし	実()	そらまめ	補
きび	実()	あずき	補
そば	種	いんげん	種
さつまいも	いも	ふつうのさとう	サトウキビのくき
じゃがいも	いも	でんさいとう	サトウダイコンの根
かぼちゃ	実		

このように、でんぶんやさとうは実・種・くき・根・いもに多くふくまれています。人は、植物のからだの中で、これらのものが特別にたくさんあるところを見つけて利用しております。

実験1. 上の表にあげたいろいろの食品について、でんぶんがどんなふうにはいっているか、けんぴ鏡でしらべてごらんなさい。

でんぶんをうすいヨード液でそめてごらんなさい。



ジャガイモ

サツマイモ

ジャガイモとサツマイモのいもは、どちらも土の中にできて、いものつき方もよく似ております。しかし、いもから芽が出るを見ると、だいぶようすがちがうことに気がつくでしょう。いもがまと親木についていたあとと、新しく出る芽の位置との関係を考えてごらんなさい。いもには芽のたくさんに出るはしと、根のたくさん出るはしがあります。ジャガイモはついていたじくの反対のはしから芽を出し、サツマイモはその反対です。これから考えて、サツマイモは、根の一部が特別に大きくふくれたもので、ジャガイモは1本のえだにそうとうするくらい形を変えたものだとることができます。じっさいのいもについてしらべてごらんなさい。あなたはどう思うでしょうか。

一ぱんに球根類を植える時に、芽の出るはしと根の出るはしを見つけて、芽の出るはしを上にするように植えつけなくてはなりません。ショウガの球根は上下をとりちがえて植えると芽が出ません。

ジャガイモ、サツマイモそのほか多くの球根類、種や実などにあるでんぶんのつぶは、葉にあるものより形が大きくて、けんぴ鏡で見やすいものです。このでんぶんはもともといもや種の中で作られたものではなくて、貯えてあるものです。だから、いもや種などは植物にとってでんぶんの倉庫とみることができます。では、でんぶんの製造工場はどこでしょうか。それは葉です。これが次の問題になります。工場と倉庫をつなぐ通路の役は、くきがつとめます。

多くの植物はでんぶんの形で養分を貯えております。サトウキビ・サトウダイコンはさとうの形で多く貯えているから、さとうを取る原料になります。さとうの原料にはならないけれど、ネギ・タマネギはやはりこの型の植物です。



サトウキビ



サトウダイコン


ジャガイモの葉の表皮
氣孔とこう辺の細ほう

ふつうのさとうとはちがうぶどうとうのほうは、廣くふつうの草や木にいきわたって見られます。しかし、量が少ないから、雑草からぶどうとうを製造したら損がいきます。

(3) 葉はどんな構造になっているか


葉の表面には、空気の通り路になる氣孔（氣孔）という小さなまど口が無数にあいてあります。まず、ここから空気とともに葉の中へはいってみましょう。

実験 2. いろいろな葉について、氣孔の形をけんぴ鏡でご覧なさい。ソラマメやジャガイモの葉は見やすい材料です。氣孔は、たいてい葉の表よりもうらのほうにたくさんあります。表にはほとんど見つからないものもあるほどです。氣孔は三日月のような形をした細ほうが、ふくれたり、

ムラサキツユクサ
の氣孔の断面ジャガイモの葉の氣孔の開へい
— 細ほうがふくれた時
— 細ほうがしおれた時

しあれたりすると、それ以後したがって、氣孔が開いたり、とじたりします。それで、空気の出入りを加減することができます。


いよいよ葉のうら側の氣孔から、内へはいることにしましょう。きょうは天気がよくて、光が強く、しめり氣が少ないので、氣孔はよく開いてあります。氣孔を通して、空気中の炭酸ガスがはいり、葉の中からは酸素・水じょう氣が出てあります。水じょう氣は別として、酸素と炭酸ガスの入れかわるのは、人のこきゅうの場合とは反対ですね。（夜には、動物でも炭酸ガスを出しています。これについては、次の問題で研究しましょう。）しかも、人がいきをする時には、むねをひろげたり、ちぢめたりしておりますが、葉はけっしてこのような運動をしておりません。葉は、きわめて静かにしてあります。ただ、外をふく風のために葉はほとんど休みなしにゆられてあります。このため、氣孔から外に出た酸素や水じょう氣は、またたく間にふき飛ばされています。



葉の構造断面図

持のいい新緑の光がふりそいでいます。まるで初夏の雑木林にはいったようです。上を見ても、下を見ても、美しい緑色を持った細ほうがならんでいます。細ほうと細ほうはうまくつながりあってはいますが、その間が十分にあいているため、どの細ほうへも自由にいくことができます。天井に近くなるほど、細ほうはぎっしりつまってきて、かき根のようです。これで、葉の緑色は表側から見たほうが、うらから見るよりこく見えるわけがわかったでしょう。

実験 3. 葉の細ほうの中に新緑の球があるのを けんぴ

カナダモの葉の 細ほう
にある緑の球


鏡でご覧なさい。葉のうすいものなら切らないで見ることができます。それには、水草のクロモ・カナダモ・陸上のものではスギゴケの類がよいでしょう。

それで、あとからくるもののために道をふさぎません。気孔からはいったすぐのところは、少しひろびろとした廣間のようです。しかも氣

(4) でんぶん はどんなにして作られるか

さて、細ほうのまくにとどいた炭酸ガスは、水にとけて炭酸になり、まくの内側の緑色の球にはいります。この緑の球は葉綠体といって、おもにたんぱく質からできていて、緑色素をとかしております。この葉綠体がでんぶんやさとうを作る工場と見られるものです。ここまでいってきただ酸は、根からすい上げられてきた水と一緒にになります。葉綠体はこの二つを原料にして、太陽の光の助けをかりて、ぶどうとうやでんぶんを作ります。この時に、いらなくなつた酸素を生みます。これが気孔から外に出て行く酸素になるのです。このはたらきは、光がなければ起りません。ぶどうとうやでんぶんが、私たちのからだの中で出す熱は、この時太陽から受け取ったものです。それで、葉のこのはたらきを炭素同化作用とか、光合成とかいいます。

炭素同化の時には、次のような式で表わせる変化が起きているものと考えられております。



炭素同化作用では、炭酸(CO_2)を二分して炭素(C)と酸素(O_2)とに分け、酸素を出し、炭素をぶどうとう中の炭素に利用しているのです。この酸素は植物のこきゅうにも使われますが、使いきれないほどできるので、氣こうから外に出ております。人や動物はこきゅうをして酸素をとり、炭酸ガスをすそであります。もし植物がなければ、空気中の酸素はだんだんなくなつて、炭酸ガスだけになるわけです。空気中の酸素と炭酸ガスについて、植物と動物とはうまく助けあつてることになります。



金魚ばち

金魚ばちの中で魚をかう時に、水草を一しょに入れておくと、魚の元気がよいことは知っているでしょう。水草は炭素同化をする時に、魚がこきゅうによって出した炭酸をとり、酸素を水中に出します。魚はこの酸素をこきゅうに使って、炭酸を水中に出します。水草と魚の間のこの交かんがつりあつてある時には、どちらもじょうぶに生きています。


(6) 水草の切り口から出るあわで炭素同化を知る法

水の中の水草から細かいあわが列になって上がっていることがあります。水草のくきを切ると一そうあわがはつ

きり見えます。このあわはおもに酸素からできていて炭素同化の結果、くきの中にたまつたものです。

実験4. 右の図のようにして水草の切り口から出る気体を集め、マッチの火えさしを入れて、酸素が多いかどうかしらべてご覧なさい。

実験5. 水草の切り口から出るあわの数は、だいたい炭素同化の強い弱いを示します。水草にあてる光の明かるさを変えて、あわの出る数がどんなに変わるかためしてご覧なさい。電燈の光を使って、うまくできます。



クロモの切り口から
あわの出る実験

(7) ヨード液で炭素同化を知る法

炭素同化で葉の中にできたでんぶんを、ヨード液でそみてみる方法です。これによつて、光がなければでんぶんができるないことがわかります。

実験6. 草の葉の一部に、うら表から黒い紙をぴったりくっつけておき、あくる日、朝からよく日にあて、その後にえだから切り取ります。切り取った葉は紙を除いて、



葉をおおう実験



アルコールに入れ、ゆっくり温めます。葉の縁の色素は、アルコールにたやすくとけ出して、葉は白くなります。白くなった葉にヨード液をかけると、太陽に照らされないとところだけでんぶん

ができますから、黒く色がつきます。

○天氣のよい日に、葉が日光に十分にあたるようにします。

○日光にあてる時間はなるべく長くします。

○アルコールで葉の色のぬきやすいものや、ぬいたあとでまっ白になるものだとうまくできます。アサガオ・ノウゼンハレンなどはよい材料です。

(8) 植物の貯えている養分

植物の貯えている養分ははじめに述べたように、でんぶんがあもなものです。このほかしほう・たんぱく質も貯えています。とくにしほうの多いものには、ナンキンマメ・ダイズがあり、たんぱく質の多いものには、ダイズがあります。しほうはでんぶんと同じように、炭素・酸素・水素の3元素からできています。葉の中ででんぶんやとう分が作られると、これを変化してしほうにすることができます。

す。たんぱく質は、上の3元素のほかに、ちっ素(N)がかならず加わっており、それで、たんぱく質はでんぶんやとう分から作ることはできません。植物はこのたいせつなちっ素をどこからとり入れるかは、問題5.で研究しました。植物は、このようにいろいろな養分を種やいもなどに貯えています。この種やいもなどは、植物が子孫をふやしていくために必要なもので、けっして人のために用意しているではありません。人はこれをつごうよく利用するために、いもや種の養分が多くなるように改良するのです。



次の間に答えてごらんなさい。

1. 次の食品は、植物のどんな部分をおもに利用しているか。線で結んでごらんなさい。

うどん、パン、米、そらまめ、かぼちゃ
種、~~実~~、花、根、くき

2. 炭素同化に関するものにしるしをつけなさい。

水素、~~O~~酸素、ちっ素、~~O~~炭酸ガス、石炭、~~O~~水、~~O~~光

3. 炭素同化とこきゅうとは、気体の出はいりはどうちがいますか。

4. 金魚ばちの中の水草とキンギョとは、どんな点で助けあっていますか。

5. でんぶんができたことは、どんな薬品でわかりますか？

ヨード液



問題 4. 植物はどのように
こきゅう をしているか



(1) 人の こきゅう と植物の こきゅう

あなたは何分間 こきゅう を止めていることができますか。おそらく数分間にすぎないでしょう。生きている限り、人はこきゅう をしないではいられないことを、あなたたちは十分に知っているでしょう。動物は、人と同じように、こきゅう が必要だということも考えられると思います。しかし、植物がやはり こきゅう をするものだということは、多くの人はあまり注意しないようです。ところが、見方によると植物は動物よりも、もっとさかんに こきゅう をしていることもあるのです。これに気がつかないのは、こきゅう は むね がひろがったり、せばまつたりして、そのたびに空気が出入りするにすぎないと思っているからです。植物は、このような運動はしていません。だから、外からは目に見えないけれども、酸素を取って炭酸ガスを出す はたらき はたえまなく続けています。生きているものはすべて こきゅう をしています。葉でも くき でも花でも種でも根でも、もっと廣くいうと、生きている 細ほう は、どれでもみんな休みなしに こきゅう をしているのです。だから、こきゅう は生きている一つの しょうこになります。

(2) こきゅう はどんな はたらき か。なぜするか

最もかんたんにいようと、空気中から酸素を取って、からだの中の炭酸ガスを出す はたらき です。なぜ こきゅう が必要でしょうか。この前の問題では、炭酸と水から でんぶん やとう分 と酸素ができる事を知りました。これをかんたんに書いてみると、



ぶどうとう ができるには、太陽の光が必要でした。炭酸と水とでは力を出すことができないけれど、ぶどうとう をたべれば力を出すことができます。このような はたらき を、とう分 にあたえたのは太陽の光です。

いま、からだの中にはいったぶどうとう に酸素がはたらくと力が出てきます。そうして、からだ は仕事をすることができます。しかし、いらないものとして炭酸と水とができるので、これをすてなくてはなりません。これが こきゅう です。(ここではぶどうとうを こきゅう に使った一例だけを説明しました。ほかのものでも同じように行われます。) この こきゅう の時の物の変り方を上のようく表わすと、ちょうどやじるしが反対の方向になればよいことになります。



こきゅう は炭素同化の反対の はたらき です。この時のガスの入れかわりは、酸素がはいって炭酸ガスが出ていくのです。

葉の緑色の部分では、晝間は、炭素同化を こきゅう と一
しょにやっておりますが、同化のほうがずっとさかんなので、
こきゅう ですてた炭酸はすぐ同化のほうで利用しますから、
酸素だけが外へすてられることになります。光が弱くなったり夜になると、同化がなくて こきゅう ばかりになり、酸素
を取って、炭酸ガスを出します。

緑色のないところでは、いつも こきゅう だけやっており
ます。

(3) さかんな こきゅう はどこで見られるか

植物は動物よりさかんに こきゅう をしていることもある
といいましたが、どこで見られるでしょう。あなたたちはよ
く知っているはずです。

A. サツマイモを畑からほりあげます。なや に積み上げた
り、かこうために土にほった あな に入れたりすると、2・3
日して、いもの中がたいへん熱くなっていることがよくあり
ます。これは いも が こきゅう をした結果出てきた こきゅ
う熱 のためです。

B. イネやムギを取り入れたのち積み上げておいた時、野
菜物でもたくさんに なや の中などに積み上げておいた時、
いも と同じように、これらも取り入れたすぐあとは こきゅ
う がさかんです。

C. ぬか(米ぬか・むぎぬか)、とくに むぎぬか を積み上げ
ておいた時、ひじょうに高い熱が出ます。この熱を利用して

ニワトリの たまご をめんどり にだかせないでかえすこと
もできます。たまご をかえすには40°Cに保つ必要があります。

D. 溫しょうにふみこんだ物、かれ草を積み上げた つみ肥
の中。つみ肥からは湯氣の上がるのを見ることはめずらしく
ないでしょう。70°Cになることがあります。発熱バクテリア
の こきゅう によるものです。

E. コウジを作る時。むした米やムギをはこに入れて、コ
ウジカビをはえさせて、コウジを作ります。カビがひろがっ
てきたらときどきまぜて、温度を下げてやらないとよいコウ
ジができません。ほっておくと 40°C 以上になります。

F. オオムギの もやし を作る時。あめ を作るには でん
ぶん のある原料(米・いも・かぼちゃ・かたくり粉など、でん
ぶんなら何でもよい)にオオムギの芽ばえたもの(もやしと
いう)をすりつぶして加えます。このオオムギの もやし を
作るには、たくさんのおオムギを水にひたしてから、ゆか に
平に積み上げ、むしろ をかけておきます。たくさん種が芽
を出すための こきゅう の熱がたまります。

そのほか、花のさく時、芽ののびる時など、とくに こきゅ
う がさかんです。上の例でもわかるように、植物は温血動物
のように、自分で温度を保つ しかけ を持っていないから、
こきゅう の熱はすぐ散ってしまいます。たくさん積み上げたり、
なや や あな倉 に入れたりして熱がにげないと、いちじ
るしく温度が上がります。温度が上がるほど、また、こきゅ

うがさかんになりますから、温度とこきゅうは助けあってますます熱くなるのが見られるのです。

(4) オオムギのもやしはどのようにするとできるか

よいもやしを作るには、オオムギの種からそろって芽を出させることができいじです。種が芽を出すにはどんなことが必要かを研究してごらんなさい。

1. 水。種には水をあたえることが必要です。一ぱんに種には水が少なくなっています。水がしみこむと、はじめて芽が活動をはじめます。
2. 光。ふつうは発芽に光はいりません。
3. 温度。あまり低くても、高くても芽が出ません。一ぱんに20°C前後がつごうのよい温度です。
4. 空氣。芽が出る時にはこきゅうがさかんですから、酸素がたくさんあたえられなくてはなりません。



オオムギの発芽の実験

実験1. 前ページの図のように、3本のびんにオオムギの種を入れ、水の深さを変えて、そろって芽を出すにはどれがよいかしらべてごらんなさい。またこきゅうによつて炭酸ガスが出ていることをためしてごらんなさい。

実験2. びんに葉をたくさん入れて、暗いところにおき、炭酸ガスがたまっていることをたしかめてごらんなさい。



次の間に答えてごらんなさい。

1. 次のこきゅうの式中、()の中の正しいほうにしるしをおつけなさい。
ぶどうとう+(水素、酸素)(→)水+(炭酸、ちっ素)
2. 芽をよく出させるにはどんなことが必要ですか。
3. さかんにこきゅう熱を出す場合をあげてごらんなさい。
4. 動物のこきゅうと植物のこきゅうとどこがちがいますか。





問題 5. 植物はどのようにして
水と養分を取りいれるか



(1) 土がないでは野菜はできないか

野菜は畑に作るもので、土をはなれて作ることを考えないのが、これまでの常識になっていました。また、畑には下肥（大小便の肥料）をかけるのがあたりまえのことになっています。下肥の中には、たいていカイチュウのたまごがたくさんありますから、これをかけて作った野菜には、ほとんどたまごがくっついております。この野菜をつけ物のように熱を加えないでたべることの多い日本人には、カイチュウの寄生しているものが、きわめて多いことになります。次の統計でこのことがはっきりわかるでしょう。

大正14年、大阪市において22種の野菜について虫のたまごをしらべたら、205回しらべたらうち89回(43.4%)はたまごがついていました。そのうちおもな種別の%は次の通りです。

ハクサイ	80.0%	若ネギ	0.0%	ニラ	20.0%
ホウレンソウ	78.5%	ミツバ	46.1%	タマネギ	16.6%
キクナ	72.7%	チシャ	42.8%	ラッキ	9.9%
ダイコン	66.6%	コカラブ	36.3%	キャベツ	7.6%
ネギ	61.6%	バセリ	30.7%	ゴボウ	0
若ナ	60.0%	若ゴボウ	28.5%	ニンジン	0

カイチュウを持っているものの数

〔全国小・中学生 約 40~90%
とくに多い地方 約 80~90%
全国平均(昭和16年) 34.4%〕

このように日本の野菜は、寄生虫をふりまく役をしておりません。しかも、野菜はくだものとともに、ビタミンをとるうえからも、新せんなんのを生でたべる必要があります。衛生にかなった野菜を作るには、下肥をかけないで作るくふうがいります。近ごろ日本でも、下肥をかけないで化学肥料だけを使って、安心してたべられる野菜を作っているところがあります。さらに進んで、土も使わないで、水に化学肥料をとかしたものばかりで野菜を試験的に作ることも行われています。そうすれば完全に土からくる病けんを防ぐことができます。これも植物と養分との関係を十分知ってはじめてできることです。




土を使わないで、小石のとこに養分を流して野菜を育てている農場。
30日育てたチシャの手入れ。PHOTO BY U. S. ARMY SIGNAL CORPS

* 新しい野菜・くだものたべる時には、まず水でよくあらうことがたいせつです。とくに野菜は、たわし・はけでよくこすって寄生虫のたまごをあらいおとす必要があります。

** 作物の根をささえるためにあらった小石を使います。

(2) 水作りの方法

土を使わないで、薬品(いろいろな化合物)をとかした水の中に植物の根をひたして育てると、植物が根からどんなものをすい上げると完全に育つのかがはっきりとわかります。



イネの水作り。1, 2, 3 はそれぞれカリウム、りん、ちっ素をふくまない肥料。4 は完全肥料。

化 合 物	分子式	重さの おもと合
じょうりゅう水	—	1,000.00
じょう酸カルシウム	Ca(NO ₃) ₂	1.00
じょう酸カリウム	KNO ₃	0.25
りゅう酸マグネシウム	MgSO ₄	0.25
酸性りん酸カリウム	KH ₂ PO ₄	0.25
塩化第二鉄	FeCl ₃	ごく少量

○作る植物としては、ソバのように早く花が咲いて実を結ぶものが便利です。

○芽ばえを作るには、あらかじめ おがくず にまいて、子

実験 1. 図のように、びんの中に次のようなわり合に化合物をとかした液を入れ、芽ばえの植物の根をこれにひたして育ててご覧なさい。

○毎週 1 回液をとりかえます。

○びんは黒い紙でまいて光をさえぎるほうがよいのです。
○化合物の種類・わり合はこのほかにいろいろあります。

葉を出さしておきます。

○上の液と比べるために、別の びん には水だけ入れて、同じように植物を育ててみます。

○カリウムをふくまない液を作って、同じように育ててみると、カリウムのない時のようすがわかります。この時には、前ページの表のうちから じょう酸カリウム だけを除いて、酸性りん酸カリウムのかわりに、酸性りん酸ナトリウムを同じ量だけ加えます。

このような方法でしらべてみると、植物は酸素・水素・ちっ素・りん・いおう・カリウム・カルシウム・マグネシウム・鉄の 9 種の元素を根から取る必要があります。このほかに、炭素は炭素同化の時、空気中の炭酸ガスから取っていますから、これを合わせると植物に必要な元素は 10 になります。

植物の養分のうち、ちっ素・りん・カリウムの三つは地中に不足しやすいので、作物には肥料をやってこれを補っています。肥料には ふつう ちっ素肥料・りん酸肥料・カリ肥料の 3 種があり、それぞれに工場で作った化学肥料がいろいろありますが、手つかなところにあるものを例にあげましょう。

ちっ素肥料 牛馬などの しきわら・ふん・りゅう安・下肥

りん酸肥料 米ぬか・過りん酸石灰

カリ肥料 草木のはい

(3) 自然界をまわる ちっ素とその同化

生物は無生物とちがった特別に複雑な はたらき をしておられます。この はたらき の みなもと をさぐってみると、みんな 細ほう の中にある原形質のしわざだということができます。この原形質がどんな構造のものであるかは、なかなかわかりませんが、おもに たんぱく質 からできています。たんぱく質は ちっ素(N)を持った化合物です。そこでこの ちっ素がどこをどうまわってくるかはおもしろい問題です。空気中にはその体積の約 4/5 の ちっ素 があるのに、人も動物も直接に使うことができません。そればかりでなく、 ちっ素 の かんたんな化合物であるアンモニア(NH_3)とか、 しょう酸カリウム(KNO_3)のようなものを飲んでも栄養にはならないのです。アミノ酸のような複雑な ちっ素化合物 だけが、からだに利用されて、からだの たんぱく質 になれるのです。空気中の ちっ素 は、まず、地中のいろいろなバクテリアのはたらきで、 しょう酸カリウム のような化合物になります。このような化合物になると、草木は根から きゅう收 することができます。植物はこれから ちっ素 を取って、アミノ酸を作りあげ、さらにこれを組み合わせて、たんぱく質 にします。これが草や木の ちっ素同化 です。こうして植物が同化した ちっ素 を人や動物が使って生活します。人や動物の出した物や 死がい はバクテリアによってくさらされ、分解してかんたんな化合物(アンモニア)になります。これは、バ

クテリアのはたらきで草や木の根から きゅう收 できる化合物(例、 しょう酸カリウム)に変えられ、また草や木にはいり、 ちっ素 はこのようにして自然界をめぐってあります。


(4) こすぎる肥料はなぜ作物をいためるか


あなたは キュウリ もみ を作る時、 きざんだキュウリに食塩をまぜると、水が出てくるのに気がついているでしょう。菜っ葉を塩でつける時に、食塩をませなければ、 おし をしても、水が上がってきません。

実験2. キュウリ・ダイコンなどの切り口に食塩をこすりつけて、つけないものと比べてご覧なさい。

実験3. ダイコン・コマツナなどの種を、水でしめした紙や綿の上にまいて芽を出させ、若い根に根毛のついているようすをごらんなさい。根毛のついた根を、いろいろなこさの りゅう安 の液につけてご覧なさい。どれくらいずみると、根をいためなくなりますか。

根の若い部分には根毛があります。根毛は一つの細長い細ほうで、土のつぶの間にはいって、そこにある水をきゅう收します。もし 細ほう の外にある液が、内にある液よ





しんとう圧の実験

実験4. 図のような細長い管のついたじょうごの中へこいよう液を入れて、口にほうこうのような動物のまくのおおいをして、その上を糸でかたくしばります。そして水の中に立てます。管の中の水面が、どれくらい上がるかごらんなさい。数時間後には、また、1日のちにはどうなるか。○よう液は水にさとう・しょう酸カリウム・食塩・りゅう安などをそれぞれ別々にとかしたものを使います。

○外側の水を中のよう液よりもこいよう液にすると、水面はどうなるかしらべてごらんなさい。

この場合、ガラスの内の水面が上がるのは、外の水はまくを通ってはいるけれども、内のさとうは外へ出ないからです。このように、かたほうだけしか通さない性質のまくがあります。細ほうまくの内側にくっついている原形質も、この性質を持っています。ガラス管の内の水面は、どこまでも

限りなく上がってはいきません。あるところで止まります。この時、外の水がおし入る力と、内の水がおし出る力がつり合っています。この力を よう液のしんとう圧といいます。液がこいほど、この圧は大きいのです。さとうを1%とかした液は、54cm(水銀柱)(15°C)ほどのしんとう圧を持っています。4%では200cm以上になります。

(5) 取り入れた水が出ていくまで

根毛と、そのほか根の表面にある細ほとにすい取られた水は、根の中心に向かって細ほくから細ほくへと移されます。そして、ついに中心にあるすじまできます。根の中心をたてに通っているすじは、水や養分の通り路であって、水はここからだんだん上のほうへのぼります。




根の断面

実験5. ヘチマのくきを地上5cmぐらいに切り、下の部分を細口びんの口につきさし、くきの切り口から出る液(ヘチマの水)を集め、その量をはかってごらんなさい。

* このようなすじを管そくといいます。管そくは根・くき・葉・花・実など植物のいろいろな部分にいきわたっていて、ちょうど、動物のからだの血管のようです。えだ分かれをした細い根がだんだん集まってふとい根になり、とうとう1本のくきにいきつきます。それにしたがって、水は根の管そく中を上がってくきへはいるわけです。

春先に木の芽の開く前に、えだやみきを切ると液がボタボタと出るものがあります。ミズキ・カエデではよく見られます。水はこのようにしてくきをのぼって葉にまでいきます。くきの中ではどんなところを流れていいくのか、くきの中をしらべてみましょう。



左 ダイコンの葉
右 サクラソウのくき

草のくきでは、くきをちぎった時、すじだけが切れるものがあります。すじだけがかたく、そのまわりがやわらかいからです。ダイコンやカブの葉を引きちぎった時にも、これがよく見えます。これがくきや葉の中の管そくです。



カボチャのくきの管そく
の根(れんこん)をたべる時、クモの糸のようなものが出てくることがあるでしょう。これは上にいうらせん形のも

実験 6. 草のくきをよこに
うすく切って、管そくのようすを、けんび鏡でごらんなさい。
管そくの中の水の通路は大きくて、まわりはあついまくになっている長い管です。このまくには、らせん形の出っぱりがついたものもあります。ハス

のが管からはずれて出てくるのです。


ハスの葉のえを切っても出てきます。いろいろな草のくきをちぎって、「ちょうちんだ」などといって遊んだことはありませんか。思い出したらそれの管そくの構造をしらべてごらんなさい。

くきの中の管そくのならび方は、タケやトウモロコシ(單子葉類)


では右の図のAの型になっていますが、クリ・キリ(双子葉類)・

マツ・スギ(ら

子植物)などではBの型になっています。



ハスのくきの管そく




單子葉類



双子葉類

くきの構造

くきの管そくの中を上がった水は、えだが分かれのにしたがって、えだの管そくにはいり、ついに1まいの葉までできます。水はさらに葉のえを通ってから、しだいにあみの目のように葉の脈にそって分かれます。葉の脈は、葉の各細ほうに水を分けたり、できた養分を集めたりする管そくのことです。



サクラの葉の脈

葉でできた養分は、管そくの中でも水の通路とは別の管を通って、水とは反対の方向に下がって、くきや根にいきます。そして養分を貯えるところ、たとえば種とかいもとかにはいって貯えられます。



次の文の正しいものに○をつけなさい。

1. (1) 肥料は多いほど作物によく生きます。

(2) 肥料はあまり多いと作物をいためます。

(3) 肥料はうすいのをたびたびやるのがよい。

2 根から上がる水と葉でできた養分とは、ともに管そくの中を通る。

(1) しかし、通る管はちがう。

(2) 通る管は同じだ。

3. (1) 根毛は根を保護する役をしている。

(2) 根毛は水をすい取る役をしている。

(3) 根毛は養分をすい取る役をしている。

4 (1) 野菜は土がなければ育たない。

(2) 野菜は土がなくても育つ。

5. 肥料の3要素は(カルシウム、マグネシウム、カリウム、窒素、酸素、水)である。



問題 6. 緑色のない植物はどこから養分を取ってくるか



(1) 緑色のない植物にはどんなものがあるか

炭素を同化するには葉緑体がなくてはなりません。緑色のない植物はこの葉緑体を持っていないのですから、自分ででんぶんやとうをつくるはたらきがないはずです。ところが生きていくには、どうしても炭素の化合物(例、でんぶん、ぶどうとう、さとう)がります。そうすると、これをどこからか手に入れなくてはなりません。そこで、食料をほかの植物や動物にたよって生きていく生活がはじまります。植物でありながら、動物のような生活です。これが寄生植物です。寄生生活には二通りあって、一つは生きていない物にたよって生活する死物寄生で、もう一つは生きている物にたよって生活する活物寄生です。

緑色のない植物はバクテリア・コウボ・カビ・キノコのような花のさかない植物に限りません。図は花のさく植物ですが、まっ白で寄生生活をしております。



ギンリョウヅク

海ぞうのうちコンブ・ワカメ・カジメ・アラメのような茶色のもの、テングサ・トサカノリのような赤色のものは、ちょっと見ると葉綠体を持っていないように見えますが、茶や赤の色素があって、それに葉綠体の色がかくされているのです。だから、海ぞうは寄生植物類にははいりません。

(2) コウジやあま酒はなぜあまいか

あなたたちが小学生の時にコウジやあま酒の実験をしたのを思い出してください。ふかした米に種コウジをまぜて、数日間温かいところにおくと、米の表面が白く毛ば立ってきます。種コウジというのは、コウジカビのほうしでウダイス色をした粉です。白い毛のようなものは、カビのからだで、細長い細ほうが1列にならんでいます。これをきん糸といいます。きん糸ができて1週間ぐらいすると特別のえが出て、その上にほうしがたくさんつきます。ほうしは飛んでいって、ごはんやのりやパンの上に落ちると、芽を出してきん糸をひろげます。きん糸は自分で炭素同化することができないから、ジアスターを出して、米のでんぶんをとう分に変えます。そうすると自分の養分として利用することができます。でんぶんがとう分に変わるから、むしした米よりコウジのほうがあま味があります。さらにこのコウジをごはんにまぜて60°Cに保溫しておおくと数時間でごはんのでんぶんをとう分に変えますから、あま味の強いあま酒ができます。あま酒を作る時の温度が低い時、もし40~50°Cぐらいに止まっていると、バクテリアのふえるのによい

温度ですから、バクテリアがふえます。バクテリアはにゅう酸を作るので、すっぱいあま酒ができてしまいます。約60°Cに保つとジアスターは最もよくはたらき、バクテリアは温度が高すぎてふえることができません。

コウジカビのほかに、もちやパンやのりにつくクロカビ・アオカビなどがあります。このようなカビはたべ物をたべられないようにしてしまいます。

(3) コウボはどのようにしてパンをふくらませるか

賣っているコウボにはかんそうコウボ(dry yeast)と圧さくコウボ(press yeast)とがあります。また空氣中やくだもの・カボチャの皮など、ひろく自然界には野生コウボがひろがっております。

実験1. こむぎ粉を水でねってコウボを少量まぜ、ふたをして数時間温かいところにおき、どんなようすが変わらるかご覧なさい。

実験2. カボチャのしんの種のまわりにあるやわらかいところだけを取り、びんの中へ水と共に入れてふたをして、数時間後にようすをごらんなさい。


上の実験でこむぎ粉がふくらんできたり、カボチャのしんからさかんにあわが出てきたら、それを少し取ってけんぴ鏡でしらべてご覧なさい。次の図のような形のコウボ

がふえているのがわかりましょう。コウボはバクテリアよりずっと大きめ、少し長い球をした一つの細胞からできています。この細胞から孔が出て、それが大きくなり数がふえていくのです。

遠い遠いむかしから、あまいくだものしるを器に入れておいておくと、さかんにあわがでて、果実酒ができるなどを、どの民族も知っていました。サルでさえも、山の奥の木のうつろや岩のくぼみに、木の実を集めて、サル酒を作っていると傳えられています。はたして、サルにそのようなちえがあるかどうかあやしいものです。しかし、サルがあまいしるの多い木の実を貯える習性さえ持っていれば、コウボはくだもの皮にも空気中にもありますから、自然に酒になります。

実験3. ブドウ・ヤマブドウ・ミカンなどの実をつぶしてびんに入れ、毎日、中のようすをごらんなさい。びんの口にかたくせんをすると、どういうことになるかためしてごらんなさい。あわになって出てくるガスが炭酸ガスであることを確かめなさい。また、温度がちがうとガスの出方はどう変わりますか。

このようにび生物がはたらいて、さかんにあわが出た



り熱が出たりして、いきおいよく物の質を変化させるのをはっこうといいます。みそ・しょう油をしこんでからいく日かたつと、だんだんわき上がるようになってきます。これもはっこうです。日本酒・ビールを作る時には、コウボがはたらいて、アルコールができます。このようなのを、とくにアルコールはっこうといいます。

コウボにはさとう類を分解して、アルコールと炭酸ガスにするはたらきがあります。コウボをいきおいよくはたらかせるには、はっこうの材料になるさとう類を加えることが必要です。パンをこねる時、さとうを加えるのは味をよくするだけでなく、このためです。さとうのない時には、とう分の多いイモやカボチャをまぜると、この助けになります。

コウボがよくはたらくというのは、コウボがいきおいよくふえて、さかんにはっこうを起すのをいでので、この両ほうのはたらきは相ともなっています。どれくらいの温度でよくはたらくかは、コウボの種類によってちがっていますが、だいたい25~30°Cがよいといえます。家庭で使うコウボはたいてい純すいなものではなく、数種のコウボがまじっていたり、いろいろなバクテリアも一緒に生活しております。だから30°C以上にしておくと、バクテリアのほうがいきおいよくふえて、すっぱくなったり、かおりが悪くなったりします。パンに加える食塩(約1.5~2%)はバクテリアをおさえる役にたっています。(なぜ役にたつか、56ページを見て考え

てごらんなさい。)

パンがふくれるのは、コウボがこむぎ粉の中にまじっているさとうをはっこうして炭酸ガスを出し、このガスがふくれてパンの中をカ梅インのようにするのです。それでガスができてもこれを中にとじこめて、にがさないことがたいせつです。このはたらきをしているのは、こむぎ粉のたんぱく質です。こむぎ粉をこねているとねばりが出てきますが、このねばるもののがたんぱく質です。いろいろな穀物の粉にはでんぶんのほかにたんぱく質がありますが、こむぎ粉のようにうまくねばるたんぱく質はありません。それでこむぎ粉にほかの粉をませる時、ほかの粉があまり多いとふくらみ方は悪くなります。ほかの粉が半分以上になると十分にうまくふくらみません。

パンをふくらませるのに、コウボのかわりに重そうをませることがあります。この時のふくらむはたらきは、全く生物とは関係のないものです。重そうは重炭酸ソーダを略した名で、分子式 NaHCO_3 の化合物です。熱すると分解して、炭酸ガスを出します。このガスがパンをカ梅インのようにするのです。


(4) みそ・しょう油・なつとうは何のはたらきができるか

みそとしょう油を作る時には、どちらの場合でもコウジを使っています。みそのコウジの材料が米(米みそ)・オオムギ(麦みそ)であり、しょう油の時にはコムギとダイズをませたものですが、はえるものは、どちらもコウジカビです。また、コウジに食塩と水をませてしこんでからのちにはコウボとバ

クテリアがはたらいて、はじめの材料をはっこりして、よい味とかおりを出してあります。このように、はじめから終りまで生物のはたらきで作られるものです。

むかしから農家の家庭では、みそもしょう油も作っている家がたくさんあります。家により、地方によって作り方がいろいろちがっていますからしらべてごらんなさい。

みそはしこんでから、早いのは20日ぐらいで賣り出しますが、しょう油はおよそ1年間はっこうさせてから、しぼります。



しょう油を作る順序



しょう油を作る時のコウボ(左)とバクテリア(右)

しょう油のカビ しょう油は使っているうちに、たいがいその表面に白いものがういてきます。これはカビではなくて1種のコウボです。コウボのうちにはパンなどのコウボのように水にしづむものもありますが、このように表面にういているのもあります。

なっとう(納豆) だいすはそのままでにても焼いても、消化のよくないものです。みそ・しょう油はび生物のはたらきでだいすを水にとけやすいものにしてあります。なっとうもこのようなくふうの一つです。

だいすをよくにてから、新しいわらの間に入れて、温かいところ(37°C)におきますと、1~2日でだいすの表面にナットウキンがひろがって、だいすのたんぱく質などを分解して味と消化のよいものにします。

ナットウキンはぼう型のもので、細長く1列にならんで

ナットウキン
(約1,400倍)

つながっております。わらつとから出したなっとうをかきまわしていると、ねばりが出て、糸をひくのはこのためです。

(5) たべ物はなぜくさるか

カンヅメの食品はさっきんと同時にみっぷうしてありますから、いつまでもくさりません。しかし、カンヅメを一度あけたら、手早くふたをしておいても中味はかならずくさります。なぜでしょうか。物がくさるのはいく種類かのバクテリアのしわざです。このバクテリアさえはいらないようすれば、いつまでもくさることはありません。カンヅメは、カンの中のバクテリアを熱で全く殺してしまって、外から新しいバクテリアのはいるのを防いであるから、いつまでも保存ができるのです。カンヅメは、ちょっとふたをあけただけでくさることから考えてもわかるとおり、くさらせるバクテリアが空気中にはどこにでも、いつでも、いるということです。このようなバクテリアは食物を分解しますが、その中には、いやなにおいのするものや有毒なものがあります。ことに動物のたんぱく質(肉や魚)をくさらせた時には、はげしい毒になることができます。これはどんなによくにてもなくなりませんから、氣をつけなくてはなりません。

物をくさらすバクテリアは、食物にはやっかいなもので

*びんづめ・カンづめの果じゅうやビールなどにごっていることがあります。にごりがあってもくさっているとは限りません。

が、すべての動物や植物の死がいやはい物のようなきかないものをすっかりくさらせて、水にとけるものにもてしまします。くさって水にとけたものは土にすいこまれ、植物の養分になります。これで自然界はすっかりそうじができるのです。

カビやコウボやバクテリアのようなび生物の中には、私たちの生活にいろいろ利用されるものがたくさんあります。そのほかに私たちのからだに病氣を起させるものもそうとうに多いのです。傳染病のせきり・腸チフスなどを起すバクテリアについては私たちの科学「人と微生物のたたかい」で述べますが、カビの中にも水虫・たむし・しらくもなどの皮ふ病を起すものがあります。これらが皮ふに寄生するとなかなかなおりにくいものですから、日常皮ふを清潔にして、病原体を近づけないようにしなくてはなりません。

(6) カビやコウボからどんな薬がとれるか

多くの自然科学者はび生物のことを研究しております。こうして、び生物のはたらきがはっきりわかると害を防ぐ道も利用する方法も新しく見つけられます。その中にはび生物から薬をとって、私たちの健康を増進するのに役だっているものがあります。

タカジアスターは高峰讓吉博士がコウジカビを研究して、これから取り出したものです。ジアスターはコウジカビの中にあって、でんぶんをとかすはたらきをしているこう

素です。これはでんぶんの消化を助ける役にたちますが、肉類は消化しません。

コウボから取った薬 コウボはビタミンBをたくさんにふくんでいますから、コウボをかわかして、ビタミンの薬としているもののがたくさんあります。

ペニシリン アオカビ(Penicillium)の類のきん糸から取り出した薬で、カノウキン・肺エンキン・ジフテリアキンのようなバクテリアを殺すのに有力な薬として、近ごろ作り出されたものです。



次の間に答えてごらんなさい。

1. 緑色のない植物はなぜ寄生生活をしますか。
2. 次のもののうちび生物のはたらきで作られるものにしるしをおつけなさい。
ウメぼし, みそ, さとう, 食塩, しょ油, ひもの,
なっとう, 食ソン
3. 次のもののうちからコウボのはたらきをさかんにするものにしるしをおつけなさい。
光, 溫度(25°C), 溫度(60°C), さとう, 鹽, 酸
4. び生物から取れる薬にしるしをおつけなさい。
ヨードテンキ, ジアスター, アスピリン, ペニシリン
5. 物をくさらせるバクテリアについて作文を書いてごらんなさい。




問題 7. 植物はどのようにしてふえるか



(1) バクテリアはどのようにしてふえるか

なつとうは、だいすのまめのまわりにナットウキンがついてできていることを習いました。このようにたくさんのバクテリアが集まっているところは、肉眼で見ることができます。その一つ一つは、けんび鏡でなくては見えません。バクテリアの中で小さいものは球のさしわたしが 0.0008 mm しかありません。ふつうはば 0.001 mm で、長さ 0.005 mm ほどです。このように小さいものですから、どのようにして数がふえるのか見ることは、みなさんにはむずかしいでしょう。ただ、数がまたたく間にふえることは、なつとうが1日にできることを考えれば想像はつくことでしょう。バクテリアのからだは、一つの細ほうからできています。この細ほうがまん中から分かれで二つの細ほうになり、おののが成長して元と同じ大きさになります。このような分れつをくりかえして、またたく間におそろしい数にふえます。



生活につごうが悪い時には、からだの中にほうしを作る種類があります。このほうしは、ていこう力がありかえして、またたく間におそろしい数にふえます。

強くて 100°C に熱しても死にません。さいわいなことに病原体のバクテリアは、ほうしを作りませんから、飲み水はわかせば安心して飲めます。

(2) コウボはどのようにしてふえるか

コウボのふえ方は前の問題で十分に研究しました。サトイモに子いもがつくようなくらいになって子孫をふやします。時にはまだなれない子に次の子ができることもあります。



コウボキン

(3) カビはどのようにしてふえるか

カビのふえ方は、前にコウジカビで研究しました。そのほかのカビで研究してごらんなさい。

実験 1. ごはんやパンをさらに入れてガラスのふたをしておけば、数日のうちにいろいろな色のカビが見られます。はじめは

クモのすか、綿毛のような白いきん糸だけです。その時には区別がつきませんが、ほうしが



クロカビ アオカビ コウジカビ
カビのほうしのいろいろ

できると、ほうしには黄や黒や青の色がついているから区別ができます。どれも特別の きん糸 の先に球(ほうし)がならんでいます。この ほうし が空氣中を飛んでいって、芽を出すと、また新しくカビがはえます。

(4) シイタケはどのようにしてふやすか

シイタケ・マツタケのようなキノコ類もカビに似た、ほうしをつくってふえます。からだの構造もカビと同じに きん糸 からできています。その きん糸 からある時期がくると、キノコがでてくるのです。

実験 2. キノコのからだをうすく切り、けんび鏡でしらべてご覧なさい。きん糸 がみつにならんできているのがわかりましょう。

マツタケ・シイタケの かさ のうらには、たくさんの ひだ があるでしょう。この ひだ の表面に ほうし があります。マツタケの かさ の開いたのを黒い紙の上にふせておくと、 ほうし が落ちて、紙の上に ひだ の もよう ができます。

マツタケは、きん糸 が、アカマツの生きている根に寄生しているのですから、作ることは自由にできませんが、シイタケの きん糸 はクリ・カシ・クヌギ・ナラ・シイ・シデのかれた材にひろがりますから、むかしからさかんに作っておきます、中でも大分・宮崎・鹿児島・静岡県がさかんです。

秋にこのような木を切りたおしておき、次の年 2・3月にみきを 1~1.5 m に切れます。切った材木を「ほだ」といいます。むかしは、この ほだ になたの切れ目をつけて、そこ


へシイタケの ほうし をまきました。そうすると ほうし は発芽して きん糸 をのばしました。いまは うめ木法 が使われています。この方法では、はじめにシイタケの きん糸 をうんとはびこらせた材木を作つておいて、これを小さく切つて、「種木」とします。これを新しい材木にあけた あな へうめこむのです。ほだの 1 本にふつう 10 本あまりの種木をうめこみます。うめこみのすんだ みき は、林の下の光の弱い、しめり氣のちょうどよいところへ図のようなくわいにおきます。うまくいくと、秋には少々シイタケがはえ、次の春にはさかんにはえてきます。

(5) その類(そら類)はどのようにしてふえるか

アオミドロはふつうに池・ぬま・田などに見られるものです。緑色の かみの毛 のようなもので、ときには田や池に一面にひろがっていることがあります。



シイタケのさいばい



アオミドロのほうし

秋になると、ならんだ2本のアオミドロの細ほうと細ほうとがくっつきあいます。そして、一ほうの細ほうのなかみが他のほうに移っていって一つになります。一つになったものは、その細ほうの中でまくを作つて丸くなります。これがほうしです。外側の古い細ほうのまくがくさって取れると水中に出て、時期がくるとほうしは芽を出し、親のアオミドロになります。

ほうしを作る時、前の(4)までのものは、自分のからだの一部分がくびれて、ほうしを作りました。ところがアオミドロでは、二つの個体の細ほうのなかみが、一つに合わさるのです。アオミドロではまだおす・めすの区別がありませんが、このような方法が進むとおす・めすの別のある生しょく法をするようになっていくわけです。アオミドロ以外のモノ類にはたくさんにおす・めすによる生しょくが見られます。

アサクサノリのふえ方／アサクサノリはみなさんになじみの深い海のモだと思います。それで、アサクサノリを海のモノ

実験3. アオミドロの細ほう
をけんび鏡でご覧なさい。一つの円筒形の細ほうの中には、らせん形の葉緑体があります。

代表としてじらべましょう。アサクサノリは東京湾のような内海の浅いところに、まだつきの竹(しげといいます。)をつきさしておくと、10月ごろからたくさんつく黒茶色のノリです。波の静かな海岸の岩の上にもつきます。黒茶色だが、すかしてみるとかすかにむらさき色を持っています。ほかの茶色のモノ類のコンブやヒジキの色とはちがうようです。アサクサノリはこうそう類といって、この類にはテングサ・トサカノリなどの赤い美しいものがたくさんあります。コンブやヒジキはホンダワラ・カジメ・ワカメと一緒にかっそう類にはいります。この二つの類のほかに、海の岩の上によく見るアオサ・アオノリのように緑色をしたもののが緑そう類です。どの類も葉緑体を持っていて自分で養分を作ります。

実験4. アサクサノリの食品になったものを、水にふやかしてけんび鏡でご覧なさい。どんな細ほうからできていますか。


「ノリのつくだに」というびんざめの物の中には、アサクサノリでなくして、アオノリ・アオサをにたものがあります。のりのつくだにといえば全部アサクサノリだと思ってはいけません。

10月ごろから竹や岩の上について芽を出し大きくなつたアサクサノリは、5月ごろ、からだの一部に精子とたまごができます。精子というのは、一つの細ほうが分れつくりかえして、多数に分かれた小さな細ほうのことです。た

まごはふつうのからだの細ほうより少し大きくて、一つのはしがとがってからだの外へつき出しています。精子はノリのからだから外に出ると水に流されて、たまごのとがった部分にくっつけます。そうすると、一つの精子のなかみがたまごの中へはいって、おののの細ほうのなかみが一しょになってしまいます。

このように形が小さくて、数多くに分れつしてできた生しょくのための細ほうを精子といって、おすの細ほうとします。これに対して、形が大きくて、数の少ない生しょくのための細ほうをたまごといって、めすの細ほうとします。おすである精子とめすであるたまごとの細ほうのなかみが一しょになるのを、受精といいます。


アサクサノリの受精したたまごは、すぐ細ほうが分か



れて8個のほうしになって、水の中を流れます。このほうしが竹や岩について芽を出すと、またアサクサノリのからだができることがあります。

(6) シダはどのようにしてふえるか

シダの類では、ワラビ・ゼンマイ・ノキシノブなどを知っているでしょう。それから少し形の変わったものでスギナ(ツクシ)・トクサなどは、シダ類によく似たものです。どれも花を持っています。ノキシノブやワラビの葉のうらには、ほうしがかたまってついてあります。ノキシノブでは、それがまるく、ワラビでは葉のへりにそって長くなっています。ゼンマイとスギナではほうしのつくものはふつうの葉と別になっています。スギナのほうしをつけるものがツクシです。




実験5. ワラビ・ノキシノブ・ツクシなどのほうしのつき方や形を虫めがね・けんび鏡でしらべてご覧なさい。

春先にツクシを取ってきて、紙の上などにおいておくと、

緑色のほこりのようなほうしが一面に落ちるもので

実験6. ツクシのほうしを虫めがねで見ながら、いきをソフトふきかけてごらんなさい。おもしろい活動をはじめます。

シダやスギナのほうしは、おす・めすの関係なしにできたものです。これが地に落ちると芽を出しますが、すぐにシダやスギナになりません。



シダでは1まいの小さなコケのようなものになります。この上にたまごと精子ができる、精子が水の中を泳いでいってたまごと一緒に(受精する)と、それから発芽してシダになります。スギナのほうしもこれと同じようなものを作りますが、たまごと精子とは別々の株にできるところがちがいます。たまごと精子のできるものは小さくて、ふつうには気がつきません。

実験7. シダのほうしを、しめしたれんがかかわらなどにまき、かわかないようにしておいてごらんなさい。芽が出て、コケのようなものができる、それからあらためて

シダの芽が出ます。

(7) 花はどのようなはたらきをするか



花のおもな部分

花にはいろいろ形の変化がありますが、だいたいがく・花びら・おしべ・めしべをそなえているのがふつうです。がくは、つぼみの時に花の外側をかこんで内を守ります。花びらは大きくていろいろな色を持ち、一ぱん目につくところです。ある花ではがくが花びらのように美しくなっていました。花びらがなかったりすることもあります。しかし、花で一ぱんたいせつなはたらきをするのは、花の中心にあるめしべとこれをとりまくおしべです。ふつうめしべは1本で、おしべは多数あります。めしべは元のほうのふくれたところがしほうで、その先がとっくりの首のように上にのび、そのちょう上が柱頭です。しほうの中にははいしゅがあります。はいしゅは大きくなって種になるものです。はいしゅの中にたまごがあるのです。おしべは細長いえの

先にふくろ がって、中に花粉がたくさんはいってあります。花粉の1つぶ1つぶが一つの 細ほう です。花粉は めしへの柱頭につくと、細長い管(花粉管)を出します。管は柱頭から中へはいって、「グングンのびてはいしゅの中のたまごまでとどきます。この時花粉管の中にある 精かく(精子にあたるものですが、花の時には 細ほう ぜんたいでなくて、細ほう の中の かくだけが、たまごの細ほう にはいっていくので、精かく といいます。)が、管をやぶって たまご の



花粉のつく図

細ほう にはいります(受精します)。たまごの 細ほう 中の めすのかくと、花粉からきた おすのかくとが一しょになつたあとで、たまごはだんだん 分れつして、成長し、種の中の若い植物となります。たまごが受精すると、はいしゅ ぜんたいは成長して種となり、しほう ぜんたいは成長して実になります。逆にいえば、成長した実の中に種があり、種の中に若い植物があるわけです。この若い植物は、種が土に落ちて水をすうと急に成長をはじめ、芽や くき や根になるのです。


このように花は私たちにとって美しくて、たいへんに目を楽しませるものであるけれども、植物は私たちのために花を

あるのですが、花の時には 細ほう ぜんたいでなくて、細ほう の中の かくだけが、たまごの細ほう にはいっていくので、精かく といいます。)が、管をやぶって たまご の

開くのではなくて、自分の子を作るために開くのです。

(8) サツマイモ・ジャガイモ・イチゴはどのようにしてふえるか

ジャガイモはかこつておいたイモをいくつかに切ったのを畑に植えてふやします。おのおのの切れには少



ジャガイモを切ったもの



ジャガイモ

サツマイモ

芽の出方

なくても一つの芽をつけておきます。この芽がのびて根をあらして1株のジャガイモになり、地下にたくさんの新しいいもをつけます。サツマイモは冬の間かこつておいたいもを春先に土にいけるとたくさんに若芽を出します。この若いくきをいもから切りとって、1本ずつ畑にさすと、くきから根が出て、それぞれ1株になって成長し、半には新しいいもができます。

イチゴは古い株から長い くき を出し、これが地上をはって先のほうへいって根をおろし、新しい小さな株になります。



イチゴ

が畑に作るものだけでなく野生のものもあります。野や山で氣をつけてごらんなさい。

生しょく というのは子どもを作ることです。子どもを作らなければ、あとつきがなくなってしまいます。あとつきがなければ、その生物の種類は死にたえます。そこで、生物はどんな種類でも子どもを作って子孫をふやします。これが生物と無生物とのちがう一つの大きな特色です。しかし、子どもを作る方法、いいかえると、生しょく の方法は種類によっていろいろちがっておりります。バクテリアのように、一つの 細ほう が 分れつして半分ずつになったのでは、どれが親でどれが子であるかさえはっきりしません。 しいていえば、分かれる前の一つの 細ほう が 親で、分かれたあとでは親がなくなって、子が二つあるといえます。コウボになると、元の 細ほう と 分かれて 出た 細ほう とは大きさがちがうから、親と子を区別することができます。カビになるとこの関係がきわめてはっきりしてきます。無数に飛びちらる青や黄の ほうし は、やがて子になるものです。アサクサノリやシダや花のさく植物では、子になる前に おす・めす という形のちがうた 細ほう (少なくも 細ほう の一部分の かく) が一しょになってから、子の 細ほう が 出発するのです。親子代々 細ほう がつながっていることをわざとではなりません。生物はいつも生物から生まれてくるだけです。



次の間に答えてごらんなさい。

1. 次の植物のうち、子をつくるのに おす・めす と関係のあるものに しるし をおつけなさい。

コウジカビ, バクテリア, コレラキン, カビチャ

2. 次の植物のうち、花のさくものに しるし をおつけなさい。

サクソラ, ノキシノブ, アサクサノリ, ヒジキ, アオガオ, キュウリ, ワラビ, マツタケ, アオカビ, シイタケ

3. 上の列のものが、あとになって下の列のどれになるか線でつないでごらんなさい。

(しほう) (はいしゅ) (たまご)
 (種) ↓ (実) (種の中の若い植物)

4. かっこの中の正しいほうに しるし をおつけなさい。

- (1) 生物は(生物, 無生物, 生物と無生物)から生まれる。
- (2) 植物は種や ほうし が(なくして)ふえない。 かも てもふえる。)






問題 8. どのようにして
良い作物を作りだすか



(1) 親の性質はどのように子に傳わるか

せい の高い子は、だいたい せい の高い親から生まれると
いうことは、だれにもわかることで、古くから知られていました
でしょうが、親の性質がどのように子に傳わるものかを実験
によってはじめてはっきりさせた人はメンデルでした。メン
デルはオーストリアの そうりょで、1865 年に研究の結果を
発表しました。メンデルはエンドウの せい の高いものと低
いものという反対の性質を持ったものをえらんで、せいが高い
ほうの花粉を低いほうの柱頭につけて、実を結ばせる方法
をはじめたのです。またこの逆に、せい の低いほうの花粉を
高いほうの柱頭につけても、同じような結果が得られました。
この方法がかけあわせです。このように、ちがう性質のもの
をかけあわして得た植物を雑種といいます。雑種のうち最
初にできたものは第1代雑種です。せい の高いものと低いもの
との第1代雑種はみんな高いものばかりでした。第1代雑
種にさいた花を自家受粉(同じ株の花粉を柱頭につけること)
をさせて得た種をまいたところ、せい の高いものと低いもの
とが 3:1 のわり合に現されました。そうすると第1代雑種
は せい が高かったけれども、せい の低い性質をかくして
持っていたにちがいないのです。せい の高い性質は せい の



低い性質に対して ゆう性 であり、低い性質は れっ性 であ
るといいます。第2代雑種では ゆう性 3, れっ性 1 のわり
合となります。第2代雑種をさらに自家受粉させて種をとり、
第3代目をしらべると、ゆう性 3 のうち 1/3 は せい の高い
ものだけでした。これは第4代目以下をしらべても、けっし
て せい の低いのは現われませんから、雑種でなくして、せい の
高い性質のみを持ったものです。これを純すい種といいます。
残りの 2/3 のものは、そのうち ゆう性 が 3, れっ性が 1 の
わり合に現されました。以上の関係を図に示すと上のように
なります。

オシロイバナの赤花と白花との間にできる第1代雑種は もも色になります。このように、ゆう性である一ほうの性質だけを現わさないで、中間型になる場合もあります。

実験 トウモロコシの種類のちがうのをかけあわして、雑種をつくってご覧なさい。トウモロコシには種の色にむらさきと黄と白とあります。むらさき種と黄種をかけると結果が見やすいのです。また、サトウトウモロコシ(つぶにしわがある)と、デンプントウモロコシ(つぶにしわがない) もよい1対の性質になります。

これまで、ただ1対の性質が子に傳わる場合を説明しました。2対以上の性質について実験をすると、親にない性質の新しい組合せが生まれてきます。トウモロコシのむらさきでまるい種のものと、白でしわのあるものとをかけあわせると、孫の代ではむらさきでしわのあるものと、白でまるいものになります。これは今までになかった新しい組合せです。

(2) 親にない性質がまれに子に現われることがある

オランダのドーフリースは、オオマツヨイグサをたくさん作っていく年も研究しているうちに、ごくまれに親に全くない性質のものが、とつぜんに現われることを見つけました。このとつぜんの変化は、その後子孫に傳わるというのです。長い年代の間にたまに現われる性質が、もし人につごうのよ

いものだと、それを保護してふやしますから、良い作物が得られると考えられます。

(3) 良い品種はどのようにして作りだすか

イネにはいろいろの品種があります。そのうち「アサヒ」は関西方面から四國・九州に、また「銀ボウズ」は関東から東北に多くつくられています。どちらもイネの品種改良に熱心な農家の人々が、明治40年ごろ、田に作られているたくさんのイネの中から、とつぜん出ていた変り種を見つけて、だいじに育ててふやしたもので、このようなくずせんの機会に良い品種が見つかることもありますが、これだけでは欲しいと思う性質を持った品種を得ることは、むずかしいでしょう。よい自然科学者が研究所・農事試験場・園芸試験場などにたくさんいて、力を合わせて良い品種を作る研究をしております。そこでは遺傳の法則にもとづいて、良い性質を持った品種の間で雑種を作り、欲しい性質をあわせそなえている品種を生み出すように努力しております。一つの良い品種を完成するまでには、長い年月のかかる根気のいる仕事なのです。イネ・ムギ・サツマイモやウマ・ブタの動物の良い品種がこうして作り出されております。

東北地方はときどき気温の低い夏をむかえてあります。この特別な気候に適したイネがなくて農家ではこまっています。そこで病気に強く、收かくは多いが味のあまりよくない「アイコク」というイネと、收かくが多く、味はよいが、病氣

に弱い「カメノオ」といふ品種とをかけあわじて、陸羽132号という收かくが多く、味のよい、すずしい夏にもよくたまる性質を持った良い品種を作ることができました。いま東北地方にはこの品種のイネがひろく作られてあります。



次の間に答えてごらんなさい。

1. メンデルは何の研究をした人ですか。
2. ド=フリースは何の研究をした人ですか。
3. 陸羽132号は何の品種ですか。
4. 雜種といふのは、どんなものですか。
5. エンドウのせいの高い性質と、低い性質のものとをかけあわせると、子の代にはどちらの性質が現われますか。



問題 9. 植物はどのような類に分けられるか



今まで本に出てきた植物や日ごろ庭で見なれている植物の種類はそうとうの数になっているでしょう。それらの植物の中には、たがいによく似たのもあり、またあまり似ていないものもあります。植物のからだの構造やふえ方そのほかいろいろの性質をよくしらべて、たがいによく似たものどうしを一つの類にまとめ、また類と類とのよく似たものどうしを近くにならべていくと、たくさんの植物の種類を部類に分けて整理することができます。このような整理ができると、植物をしらべる場合や利用する場合にたいへん便利なことがあります。たとえば、ある薬がAの植物から取れることがわかると、Aと同じ類のBにもそれがふくまれているかも知れないと見当をつけることができます。また、Aの植物にどんな肥料がよいかがわかると、Bの植物にも同じことがいえるかも知れないと考える場合もあります。また、Aの植物とB'の植物との間では、かけあわせやつぎ木をすることができるかもしれないということを考えられます。

次の表は植物の類別の1例であって、からだの構造のかんたんなものから複雑なものへ移っていくようにならべてあります。あなたの知っている植物が、次の類別のどこにはいるか研究してごらんなさい。

【おもな植物の類別の表】

花のさかない植物(ほうし植物)

例

バクテリアの類(細きん類)	コレラキン・腸チフスキノ・腐らすバクテリア
ミドリムシの類	ミドリムシ
けいそうの類	ケイソウ
アオミドロの類	アオミドロ・ツヅミモ
縁そう類	アオサ・アオノリ
かっそう類	コンブ・ワカメ・ヒジキ・ホンダワラ
こうそう類	アサクサノリ・テングサ・フノリ
カビ・キノコの類	
カビ類	コウジカビ・アオカビ
コウボキ類	ビールコウボ・バンコウボ
キノコ類	マツタケ・シイタケ・ナメコ・シメジ
(地衣類)	イスランドゴケ
コケ類	
ゼニゴケ類	ゼニゴケ
スギゴケ類	スギゴケ・ミズゴケ
シダ・トクサの類	
シダ類	ワラビ・ゼンマイ・ノキシノブ
トクサ類	スギナ・トクサ

花のさく植物(種子植物)

A. ら子植物(はいしゅがしほうの中にはないもの)

ソテツ類	ソテツ
イチョウ類	イチョウ
マツ・スギの類	アカマツ・クロマツ・スギ・ヒノキ

B. ひ子植物(はいしゅがしほうの中にあるもの)

a. 単子葉類(子葉が1まいのもの)

イネ科*	イネ・ムギ・アワ・ヒエ・トウモロコシ・アシ・シバ・ススキ・モクソウ・マダケ・ハチク
シユロ科	シユロ・ヤシ
テンナンショウ科	コンニャク・サトイモ
ユリ科	ユリ・ネギ・チューリップ・ヒヤシンス
アヤメ科	アヤメ・ハナショウブ・カキツバタ・サフラン
ラン科	サギソウ・フウラン・エビネ・シラン
b. そう子葉類(子葉が2まいのもの)	
ブナ科	ブナ・クリ・カシ・シイノキ・クヌギ
クワ科	クワ・コウゾ・アサ・イチジク
タデ科	タデ・スイバ・ギシギシ
ヒツジグサ科	ハス・スイレン・ジュンサイ
ケシ科	ケシ・ヒナゲシ・タケニグサ・コマクサ
アブラナ科	ダイコン・カブ・カラシナ・ハクサイ・ナズナ
バラ科	ヤマブキ・バラ・ウメ・サクラ・リンゴ・ナシ・ビワ・イチゴ・カイドウ・ボケ
マメ科	ダイズ・アズキ・ナンキンマメ・エンドウ
カエデ科	イタヤカエデ・イロハカエデ
ブドウ科	ブドウ・ノブドウ・ヤブガラシ
ツバキ科	ツバキ・サザンカ・チャ・モッコク
スミレ科	スミレ
シャクナゲ科	シャクナゲ・ツツジ・アセビ
ヒルガオ科	ヒルガオ・アサガオ・サツマイモ
ナス科	ナス・トマト・ジャガイモ・ホウズキ・タバコ
ゴマノハグサ科	キリ・サギゴケ

* 生物を類別する時の元になる単位を種として、その上に順次に属・科をおきます。

ウリ科

キク科

キュウリ・カボチャ・スイカ・カラスウリ

ヨメナ・ゴボウ・シュンギク・アザミ・キク



次の間に答えてごらんなさい。

1. ほうしを作る植物にはどんなものがありますか。
 2. 種のできる植物にはどんなものがありますか。
 3. 次の植物はどの類にはいってありますか。
アサガオ・マツ・コウボ・キク・ヨツタケ・スギナ・
イチョウ・コムギ・ワラビ・サトイモ
 4. 学校の庭にある草や木の名をしらべて、類別の表に入れてごらんなさい。
 5. あなたが 花びん にさす花の名をしらべて、類別の表
に入れてごらんなさい。

私たちの科学 5 植物はどのようにして生きているか

昭和 22 年 12 月 8 日頃発 同日機械印刷
昭和 22 年 12 月 12 日発行 同日機械印刷
〔昭和 22 年 12 月 12 日 大日本雄略會〕

定價 4 円 30 錢

著作権所有

省部文作仁著

東京獨占半坡保產二丁目五番地

日本圖書株式會社

発行者 大日本圖書株式會社

APPROVED BY MINISTRY
OF EDUCATION
(DATE DEC. 8 1947)

代表者 佐久間長吉

本章新內容在第十一節，不見十二節

東京都新宿区市谷加賀町一丁目十二番地
TEL 03-3375-5500

印刷者 大日本印刷株式會社

代表者 佐久間長吉

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

発行所 東京都中央区銀座一丁目五番地 大日本圖書株式會社

Digitized by srujanika@gmail.com

長富祐一郎

NO. 5
西歷 中月
長富藏書

