


Approved by Ministry of Education  
(Date May. 9 1946)

昭和廿一年五月十四日  
文部省調査費局  
昭和廿一年五月十九日印  
昭和廿一年五月十三日發行  
昭和廿一年六月廿八日郵局  
定價金壹圓拾錢

著作権所有者 文部省  
發行者兼  
印刷者 東京都新宿區新宿二丁目十六番地  
代表者 森下松平  
電 話  
新井修平  
傳 堂

發行所 師範學校教科書株式會社



日本婦兒保健本科学用

では酸化し易く、また熱やアルカリによつても破壊され易い。しかし空氣と  
熱を避けねば温度が高くとも破壊され難い。随つて蔬菜類を長く煮たり挽  
たりすると失はれることが多くなる。それ故加熱を必要とする場合は出来  
るだけ短時間に處置するやうに注意することが大切である。また酸化酵素によ  
つても分解されるから、蔬菜や果實類は貯蔵法が悪ければ殆ど含まなくなるので  
注意を要する。

#### 四 ビタミンD

カルシウムと磷の物質交代を調整して骨の發育をつかさどり佝僂病を豫防す  
るビタミンをビタミンDといふ。脂肪に溶け水には溶けない。肝臓に多く含ま  
れ、肝油、白子、魚卵やバタ、鶏卵、肉類等にも多く含まれてゐる。ビタミンAよりも酸  
化され難く比較的安定である。

植物體にはビタミンDは大體含まれてゐないが、日に乾した椎茸や草類等には  
その効力がある。これは、この中に含まれてゐるエルゴステリンが日光の紫外線  
に照射されてビタミンDになるからである。かやうにそれ自身にはビタミンD

の作用はないが、紫外線照射により、その作用を現はす化合物がプロビタミンDである。

#### 五 ビタミンE

穀類の胚芽、蔬菜類に多く含まれてゐり、脂肪には溶けるが水には溶けない。熱、  
光、空氣に對して抵抗力が強く、アルカリや酸にも安定であるから、調理によつて破  
壊されることもなく、普通の食物を摂つてゐればこれに不足することは殆どない。  
また動物の繁殖に必要なものといはれてゐる。

③ビタミンと調理との關係 ビタミンにはA、B、C、Dの外にもなほ種類が多く、  
その中には實際問題として日常食に多く含まれてゐて不足する憂の少いものも  
あるが、僅かしか含まれてゐないため不足がちになるものもある。なほビタミン  
には、食物の栄養素として明らかになつてゐるもの、ほかに、未知のものもあると  
考へられてゐる。しかし現在知られてゐるものの中で、わが國民の食習慣上最も  
注意すべきものはBであり、A、C、Dに關してはそれ程顧慮する必要はない。これ

等は一般に熱・光・酸素によつて變化し易く、變化すればビタミンとしての効力が失はれる。故に調理の方法が適當でなければ食品に含まれたものも無効になるおそれがある。食物はなるべく自然のままがよいといはれるのはこのためである。また食品には、日常必要とするビタミンの或ものを缺くか、或は不足するものが多から、調理に當るものは種々の食品を配合してビタミンを十分攝取出来るやうに留意する必要がある。

## 第七節 水

水は人體組織を構成する要素であつて、體重の約三分の二を占めてゐる。攝取された水は消化吸收を容易にし、血液や體液を適宜の濃度に保ち、體内に生じた老廢物を排出するなど種々の生理作用にあづかるものである。隨つて體内に水分が缺乏すれば、種々の故障が生じ、忽ち健康を害するやうになる。食物の缺乏に比し、飲水の缺乏が人體に耐へ難いのもこれによつて明らかである。

水はすべての食品に含まれてゐる。穀類や穀粉には少いが、獸肉や魚肉には多く、殊に蔬菜類果實類には最も多く含まれてゐる。食物中の水分は、調理の際自由に加減することが出来るから、食品としての水の分量は殆ど顧慮する必要がない。また水は諸種飲料の原料となつてゐる。

飲料水としては、都市では一般に水道水を用ひるものが多いが、その他では井戸、河川、泉等の水を用ひてゐる。水道水は最も安全な飲料水であるが、その他の水を飲料とする場合には、無色無臭のもので一種の清涼味を有し、病原菌や寄生虫卵が混在せず、食鹽アムモニヤ硝酸亜硝酸燐酸有機質を含んでゐないものを選ばなくてはならない。また硬度の高い水も避けた方がよい。

## 第四章 細養素の作用

### 第一節 食物の消化

①消化作用 食物に含まれてゐる蛋白質、炭水化物、脂肪その他の細養素の多くはそのままでは細養分として體内に吸收されない。食物が細養となるためにはこれを體内に吸收出来るやうな形に變化させる働きがなければならない。この働きが消化作用である。

消化作用には二つある。一つは咀嚼による細摺、胃腸の收縮及びうごめき運動による消化液との混和のやうな機械的作用であり、他は消化器から分泌する消化液の酵素による分解作用である。消化作用は、口腔・胃・小腸・大腸に於いて順次行はれるのであるが、各部に於ける消化作用は互に密接に連絡し影響し合つてゐる。例へば食物を見ただけで唾液の分泌が起り、食物を口にすれば胃液の分泌が起るのである。また胃の働きは小腸の働きを促進し、小腸の働きは大腸の働きに影響するのである。なほ精神作用が食慾、消化液の分泌、消化運動など消化作用全般に對し重大な影響を及ぼしてゐることを忘れてはならない。

口腔内に於ける消化 食物は、口腔内で歯と舌との作用で咀み碎かれると同時に唾液が混和される。唾液は粘稠性のある弱アルカリ性の液で、この中にはアチアリンといふ酵素が含まれてゐる。アチアリンは、微アルカリ性に於いて澱粉を麦芽糖に變化させる作用がある。食事中咀嚼を長くつづけてゐると、口内に甘味を感じるのはこれがためである。また食物を口にするとき既に胃液は分泌される。これを食慾胃液と呼び胃に於ける消化に重大な作用をもつてゐる。おいしく食事をすることが消化作用を圓滑にさげる所以はこのことからでもわかる。唾液は咽頭食道を粘滑にし、咀嚼された食物を容易に嚥下させる働きをする。食物が口中に滞留する時間は短いが、この唾液酵素による消化作用は、胃に入つてからも食物が胃液と混和されるまではづけられるのである。要するに、口腔に於ける消化作用は食物を完全に消化するための第一階段であつて、これが十分に行はれてゐなければそれから後の消化作用は完全に行はれない。食事にはまづ食物

をよく噛むことが大切である。

胃に於ける消化 食物が胃に入ると、胃はその刺激によつて壁の粘膜から胃液を分泌し、伸縮して機械的に食物を揉み碎き胃液とよく混和させる。胃液は透明もしくは幾分潤滑した液で、鹽酸を含んでゐるから酸性である。鹽酸には病原菌を殺滅し、腐敗を防ぐ作用がある。胃液には、またペプシン・ラーブ・リバーゼ等の酵素が含まれてゐる。ペプシンは、鹽酸の助けにより蛋白質をペプトンに變化させ、ラーブは、乳兒の胃液に多く存在し、飲んだ乳の蛋白質を凝固させて消化し易い形とし、リバーゼは、脂肪を多少分解する。食物が胃に留まる時間は、その種類によつて異なるも、炭水化物が最も短く、脂肪がこれに次ぎ、蛋白質が最も長い。消化が進むと食物は粥状となる。これが即ち糜粥である。

腸に於ける消化 糜粥が胃の幽門から十二指腸に移ると、肝臓から分泌する膽汁、胰臍から分泌する胰液に混和され、酸性であつたものがアルカリ性となり小腸に送られる。

膽汁は、アルカリ性で、黄色の苦味を帶びた粘稠な液である。糜粥をアルカリ性

に變化させ、脂肪を乳状化し、胰液内の酵素の作用を容易ならしめる。

胰液には、トリプシン・ステアブシン・アミロブシン等の酵素が含まれてゐる。トリプシンは、蛋白質を分解してプロテオーゼ・ペプトンとし、更に進んでアミノ酸にまで分解し、ステアブシンは脂肪を脂肪酸とグリセリンとに分解する。アミロブシンは澱粉を麦芽糖に分解する。

腸壁からも腸液が分泌される。腸液はアルカリ性で、インペルターゼ・マルターゼ・ラクターゼ・リバーゼ・エレブシン等の酵素を含んでゐる。インペルターゼは蔗糖を葡萄糖及び果糖に、マルターゼは麦芽糖を葡萄糖に、ラクターゼは乳糖を葡萄糖とガラクトーゼに分解し、リバーゼは脂肪を脂肪酸とグリセリンに分解し、エレブシンはプロテオーゼとペプトンをアミノ酸に分解する。

かくして糜粥が小腸まで來ると、その中の蛋白質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸とグリセリンに、炭水化物は葡萄糖に分解されて吸収出来る形にまで完全に消化されるのである。このやうに消化は小腸内で一應終り、殘渣は大腸に移行する。殘渣には、動植物の纖維、消化不良の蛋白質、少量の糖化しない澱粉等が含まれてゐる。

大腸内では消化液は分泌されないが、ここで残渣は細菌主として大腸菌による醣酵又は腐敗作用を受けて多少消化され、糞便となつて直腸に送られる。直腸では水分が吸收され糞になる。

② 吸收作用 消化作用によつて可溶性となつたペプトン・アミノ酸・葡萄糖・脂肪酸・グリセリン、乳状化した脂肪は、水無機質・ビタミン等とともに消化管の壁の細胞によつて攝取されるがこれ即ち吸收である。吸收は胃・大腸でも多少行はれるが大部分は小腸で行はれる。

小腸の粘膜は、皺襞に富むばかりでなく、絨毛が無数に存在してゐる。これがため小腸の表面積は非常に廣くなり、吸收作用が盛に行はれるのである。絨毛の中には、血管とリンパ管とが分布してゐて、細胞を通過した栄養分を運搬する。即ちアミノ酸・葡萄糖・無機質等は、血管から門脈を経て肝臓に入り、そこから一般の循環系に入り、脂肪類はリンパ管を経て胸管に集り心臓の附近で血液に入る。かくして栄養素は體内各部に配分される。

③ 消化率 摂取した食物は、その全部が消化吸收されるものではない。不消化分、は、食品の特質、調理法等によつて異なるものである。それで食物の消化の良否を見るには、摂取した食物の量と排出した糞便の量とをしらべ兩者の差を以て吸收された量と認める。摂取した栄養素に對する消化吸收した栄養素の割合を百分率であらはしたもののが消化率である。一般に澱粉や糖類の消化率は高く、動物性の蛋白質や脂肪がこれに次ぎ、植物性の蛋白質の消化率が最も低い。

## 第二節 物質交代

① 蛋白質の物質交代と栄養價值 筋肉・臓器・皮膚等身體の主要部分は主として蛋白質から成るものであるが、この蛋白質も生體が生活活動を営む際には常に破壊・分解をうけるので、これを補ふことが必要である。この補給は、血液によつて運ばれる諸種のアミノ酸が結合することによつて達せられる。

消化管から吸収されて血液中に入るアミノ酸の量及び種類は、食物として摂つた蛋白質を構成するアミノ酸によつて左右されるが、その量や諸種のアミノ酸の割合は筋肉臟器をつくるのに必要なアミノ酸と同じではないのでそこに識別が行はれる。筋肉構成に不足したものや缺如したものがあると、これを他種のアミノ酸でつくるとする。例へば、アラニンやチロシンが不足であると、これを他のアミノ酸を材料としてつくり、以て筋肉構成に支障なからしめることが出来るのである。しかしアミノ酸の中には、他のアミノ酸から變化合成することの不可能なものが幾種類がある。かかるアミノ酸は腸壁から吸収されねばならない。即ち食物から攝取する以外に道はない。

體内で合成されず、體外からの攝取によらねばならぬアミノ酸としては、バリン・ロイシン・イソロイシン・トレオニン・フェニルアラニン・トリプトファン・リシン・ビスチヂン・メチオニンの九種が挙げられる。而して食物中の蛋白質の栄養價值は、これらの不可缺なアミノ酸の含量如何によつて定まるわけである。例へば玉蜀黍蛋白ツエインは、トリプトファン及びリシンを缺き、小麥蛋白グリアテンは、リジンを缺くを以て、これらの蛋白質のみを給與するも栄養不完全である。しかし一般にはかかる單一蛋白質のみを摂ることは稀で、多種の蛋白質を混合して摂るから、不可缺のアミノ酸が缺乏するやうなことは少いが、偏食するといづれかのアミノ酸に不足を來だし、遂に栄養不良に陥るから注意せねばならない。一般に植物性蛋白質は、トレオニン・リシンに乏しいから、これらの含量が多い動物性蛋白質を併せて摂ると栄養上完全である。

體蛋白質構成に使用されなかつたアミノ酸及び老廢した體蛋白質は、酸化分解されてエネルギー源となる。この際、蛋白質にある窒素は、殆ど全部尿中に排出される。故に尿中の窒素量を測定することによつて、體内で分解された蛋白質量を知ることが出来る。

○脂肪炭水化物の物質交代と栄養價值 脂肪は吸收された後、燃焼してエネルギー源となるものであるが、一部は皮下その他に沈着して體脂肪となる。肥満しているか否かはこの沈着した脂肪の多寡によるのである。この體脂肪の大部分は、

結局燃焼するための貯藏物と考へられるものであつて、食物を攝らない時にはこの體脂肪が活用され燃焼してエネルギーを生ずる。

炭水化物は、單糖類となつて吸收された後、一旦肝臓に於いてグリコゲンに變り、これが必要に應じて再び葡萄糖となり、血液によつて諸組織に運ばれて燃焼し、エネルギーを生ずる。血液中には常に約〇・一%の葡萄糖が存在し、健康者に於いてはこれより多くなることも少くない。これは肝臓がグリコゲン生成量及び分解量を調節してゐるからである。

體内に於いて葡萄糖が燃焼する際には、ビタミンB<sub>1</sub>の存在が必要であることが明らかとなつてをり、B<sub>1</sub>缺乏のため神經炎の起るのは葡萄糖燃焼の不完全に起因すると考へられてゐる。

脂肪の營養價は主としてその脂肪を組成する脂肪酸の種類によつて左右される。

が、大體に於いてオレイン酸やミリスチン酸以下の脂肪酸から成るもののが最も營養價高く、リノレン酸や蝦酸のやうに不飽和度の高い脂肪酸から成るものは營養價が劣る。食用油脂の中では、牛乳バタが最もよく、椰子油・だいづ油・ごま油等がこれに次ぎ、魚油・鯨油等は一般に營養價が低い。人造バタは、主としてだいづ油等の植物油或は魚油を硬化したものを作成するのであるが、その營養價は牛乳バタに比べると遙かに劣ることが多い。

炭水化物は、澱粉でも糊精でも或は蔗糖でも營養價には殆んど差異がない。要するに消化管内で分解して單糖類を生ずるものは、同一の營養價があると考へてよい。これに反し消化管内で單糖類とならないもの例へばセルロースのやうなものは、營養には殆ど直接役立たない。しかしこれを適量に攝ることは、腸の機械的消化運動を促進し便通を整へる上に效果がある。

### ②ビタミンの作用 营養には、體内諸器官の作用を協調し、その活動に必要な營養素を供給し或は老廢物を排除するに役立つ物質の存在することが必要である。

その主要なものは無機質、ビタミン及び水であるが、ビタミンは特に重要なものである。

ビタミンの必要な量は極めて微量であるが、これが缺乏したり或は不足したりすると、たとへ他の栄養素が十分であつても正常な生理作用を營むことが出来ないから、栄養障害を起すことになる。

一、ビタミンA　ビタミンAが不足すると夜盲症に罹り、薄暮に視力を失ひ、甚だしくなると乾燥性眼炎、角膜軟化症等に陥つて遂には失明する。その他皮膚粘膜に失調を來して外界に對する抵抗性が弱くなり、傳染病に犯される機會が多くなるといはれてゐる。ビタミンAを一時に多量攝取すると、必要量以外は體内に貯蔵されるので、當分はこれを攝取しないでも、健康に支障を起さない。

ビタミンAの給源をなす主な食品は、色の着いてゐる野菜、果物類である。なほ肝油には非常に多量のビタミンAが含まれてゐる。

二、ビタミンB<sub>1</sub>　ビタミンB<sub>1</sub>が缺乏すると脚氣症に罹り、それが不足すると倦怠感を伴なひ、疲労し易くなる。ビタミンB<sub>1</sub>を必要とする量は、主として炭水化物を

攝取する量に比例し、炭水化物を攝取する量が多ければB<sub>1</sub>もまた多量に攝取しなければならない。而して米を主食とするわが國ではB<sub>1</sub>の不足に對しては特に注意を要するのである。これは炭水化物が體内で完全に燃焼するには、ビタミンB<sub>1</sub>の存在を必要とするのに基づく。もしB<sub>1</sub>が不足すると、炭水化物の物質交代は障碍され、中間生産物が體内に集積して生理機能に悪影響をもたらすことになる。

ビタミンB<sub>1</sub>は、Aと異なり體内に多量に貯へられることなく、常に尿より排出されるものであるから、絶えずこれを攝取して補給する必要がある。

三、ビタミンB<sub>2</sub>　ビタミンB<sub>2</sub>は、體内に於ける燃焼過程の促進に役立ち、栄養上不可缺なることは確實であるが、それが缺乏した場合にどんな症狀を呈するかについてはまだ明らかにされてゐない。

四、ビタミンC　ビタミンCが缺乏すると壞血病に罹り、皮下に出血を起し、骨格は脆弱となり、これが不足すると外界に對する抵抗性が弱まるといはれてゐる。

ビタミンCが體内に於ける酸化還元の機構に關與することは確實とみられてゐるが、その詳細についてはほ不明である。

五 ビタミンD ビタミンDは骨器の形成に關係するもので、これが不足すると佝偻病に罹る。ビタミンDを必要とする量は攝取する石灰と磷の比率によつて異なり、石灰磷の攝取が不均衡の場合にはその量も高まるやうである。

## 第五章 草養の基準

健康を保持し勞作を營むために必要な食物の量は、性年齢體格等によつて異なり、また同一人でも勞作の程度によつて日毎に異なる。一般に食物の攝取量は食慾によつて決められるが、食慾だけにたよるとややもすれば過食したり或は少食したりして健康に害を及ぼし易い。それ故身體の要求する大體の草養の基準を定め、それに従つて食物の量を定めることも必要である。

### 第一節 草養量

○草養量の決定 草養量の決定には從來種々の方法が用ひられて來た。例へば、國內で消費される食品の總量を人口數消費單位に割當て、一人當りの數量を決定する方法がある。この方法は、今日もなお實際上に適用されてゐるが、生理的に必

要な栄養量を決定することは出来ない。又多數の人々が日常攝取する食物の實量を食品別に調査して必要量を決定する方法もあるが、これも前の方と同じく栄養的に妥當な數値を得ることは出来ない。更にまた出来る限り多數の被試験者の各々についてそれぞれの體重が一定に保たれるやうに食物を加減して與へ、その際攝取した食物と共に相當する糞便等に含まれる栄養素の量を測定し、兩者の差を以て實收量を決めこれを必要食量と決定する方法もある。以上種々の方法があるが、今日では實際に人體の消費するエネルギー量を測定し、これに基づいて各栄養素の量を決定する方法が採用されてゐる。このためには、まづ各種有機栄養素の燃焼による發生熱量が明らかにされなくてはならない。

○各種有機栄養素の燃焼と發生熱量 炭水化物脂肪蛋白質は人體内に於いて酸化燃焼する。この際發生する熱がエネルギーの源となる。

炭水化物が完全に酸化分解せられると、 $C_6H_{12}O_6 + 6CO_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ となり、酸化に要する酸素と等容の炭酸ガスを發生するわけであるが、呼吸で排出される炭酸ガスと酸素との比を呼吸率と呼び、炭水化物の場合にはその呼吸率は一・〇である。炭水化物一瓦が完全に燃焼する際には、酸素〇八一リットルを消費し四・一カロリーの熱を發生する。

脂肪についても全く同様にその熱量を定めることが出来る。今ステアリンを例にとれば、 $2C_{17}H_{34}O_2 + 16CO_2 \rightarrow 14CO_2 + 11H_2O$ の式の如き酸化が行はれ、呼吸率は約〇七となるが、天然に産出する混合脂肪の實際についても、體内に於ける燃焼の呼吸率は同様〇・七〇七である。脂肪一瓦は燃焼の際、酸素一九六リットルを消費し、九三・カロリーを發生する。蛋白質は炭水化物脂肪と異なり、平均一・六%の窒素を含み、その分解過程も前二者と異なるところが多い。體内では蛋白質は完全に燃焼するものでなく、その一部は必ず尿素その他の状態でなほ熱量を保有したまま、尿として排出される。この結果、體内に於ける發生熱量は體外に於ける燃焼熱量より低く、一瓦に付四・一カロリーとなる。呼吸率は〇・八〇一で、燃焼に際して一リットルの酸素を消費すれば四・四・八五カロリーを發生する。

人體内に於いては、以上の三有機栄養素がそれぞの原則に基づいて混合燃焼

する。その際炭素は炭酸ガスとなり、主として肺臓及び皮膚面から排出され、極く一部が尿に出る。水素は水となり肺臓皮膚面から、或はまた尿として排出される。窒素は殆ど全部が尿としてそのうち極く微量が皮膚面から排出される。随つて肺臓皮膚面から排出される發散物と尿とを集めると、體内に於ける栄養素の分解産物を捕集することが出来、これを定量すれば各栄養素の分解した量を決定することも出来る。そこで、これらの分解物を完全に捕集する装置が種々考へられるわけで、呼吸装置やカロリーメーターなどはその一例である。

② 成人一日に要するエネルギー量 一日に消費するエネルギー量は、同一人についてもその労作の程度、時間及び休養・睡眠等によつて異なるものであるから、厳密にいへばこれが決定は不可能である。しかし日常生活では、労作の程度、休養等は大體一定してゐるから、一日に要するエネルギー量に著しい差は生じない。餘剰のエネルギーは體内に貯蔵出来るから、たとひ一日に要するエネルギー量と食物の攝取量との間に幾分の差があつても、輕微であれば支障を來すことはない。そ

れ故、同一人が大體同一の労作に從事するトすれば、一日一定の熱量を含む食量を攝取すればよい。特殊な重労作に從事する人を除くと、大多數の人は中等度の労作とみなしえるから、これを一般に基準としてゐる。即ち標準の成年男子が中等度の労作に從事する場合に要するエネルギー量が栄養の基準といふことになるのである。

成年男子が中等度の労作をなす場合に、一日に要する特殊エネルギー量は基礎エネルギー量の二分の一に當る。即ち基礎エネルギー量(日本人の成人の實測値平均は「三四七カロリー」とその二分の一の特殊エネルギー量(六七四カロリー)の合計「二二一カロリー」)が必要なエネルギー量である。これを食物から消化吸收するには、またそのためにエネルギーを要するが、この量は基礎エネルギー量の約一〇% (二三五カロリー) 程度である。なほ攝取する食物の熱量中不消化のまま糞便中に徒費される量は、平均約一〇% であるから、以上全部を考慮して基礎エネルギー量の一・七七倍が一日に必要とするエネルギー量である。

$$A = \left( B + \frac{B}{2} + \frac{B}{10} \right) \div \left( 1 - \frac{1}{10} \right) = B \times 1.77 \quad Aは1日の所要エネルギー量  
Bは1日の基礎エネルギー量$$

この成人基準のエネルギー量は栄養問題に於ける食量の標準単位となるもので、この場合成人一日に要する量を一消費単位といふ。而して女子青少年老人の量は、成人の量に一定比率を乗じて求める。

以上のやうに、各人一日に要するエネルギー量の決定はなかなか複雑困難であるが、實用としては以上の要因をすべて包含するカロリー計算尺やノモグラフがあるから年齢性身長體重がわかつてゐれば、極めて容易に所要のエネルギー量を算出することが出来る。

## 第二節 各種栄養素の必要量

①炭水化物 炭水化物はエネルギー源として最も利用し易く、しかも最も安價な栄養素である。而して現状に於いては、一般に必要エネルギー量の七〇乃至九〇

%が炭水化物から供給されてゐる。米その他の穀物を主食とする日本人には、炭水化物過多の虞はあるが過少の心配はない。けれども高價な脂肪や蛋白質を節約するには、極端に偏しない限り相當量の炭水化物の攝取が有効であるばかりでなく経済的である。

②脂肪 脂肪はエネルギー源としては炭水化物を以てこれに代へることが出来るから、脂肪の最少必要量を決定するには及ぼない。しかし食物に脂肪を全く缺くことは保健上考慮を要することである。實際上もし脂肪を缺くやうなことがあると、食物の味を害ひ嵩の割合に豊富なエネルギーを包含する食物の調製が出来ないことになる。成人は全エネルギー量の一割内外を脂肪で補ふやうにすることが望ましい。

③蛋白質 蛋白質はエネルギー源として役立つとともに、人體の構成にもあづかり、他の栄養素を以て代用することとの出來ないものである。即ち栄養上獨自の意義を有するものであるから、適量を攝取する必要がある。この量については古くから研究せられており、種々の説も行はれてゐるがまだ結論には達してゐない。

特に質の良否と配合される他の栄養素との関係が必要とする量に重大な影響を及ぼすため、その量を決定することは困難である。即ちフォイトの習慣食に関する研究に始まり、高蛋白食或は低蛋白食の提唱等があつて、今まで定説に至らない。日本人に適當な蛋白質量は、その全量の四分の一が動物性食品から供給されることを條件にして、大體成人一日に對して七〇瓦乃至八〇瓦である。なほ一般に成長期にある者には蛋白質量を増加する必要があり、老年期にあるものはこれを減少するのが適當である。

④無機質 石灰燐 石灰と燐の供給は常に離して考へてはならない。石灰と燐の比は一對一乃至一對一五がよい。

成人男子は、體重一斤につき〇・〇一瓦又は必要とする蛋白質一〇〇瓦について一瓦、即ち一日〇・五乃至〇・八瓦の石灰を攝ればよい。しかし、成長中のものは石灰を必要とする量が大きい。生後二年までは一日〇・八瓦位、五歳までは一・〇瓦位、一五六歳の成長が急速な時期には二瓦位がよく、それから次第に減じて、成人では

大體〇・五五瓦でよいといはれ、妊娠は一日一五乃至三瓦、授乳婦は二乃至四瓦を必要とするといはれてゐる。故に發育中の青少年、妊娠授乳婦は特にこの點に留意しなければならない。

燐は常に石灰と適當の比を保つて攝取せらるべきであるから、その量は自ら決定される。

鐵 鐵を必要とする量については諸説あるが、成人は一日一二斤、幼児や成長中の者は、その必要とする熱量一〇〇カロリーにつき〇・七五乃至一瓦とするのが妥當である。而して妊娠授乳婦には成人量の二、三倍を必要とする。

ナトリウム・カリウム 成人は一日に平均一〇瓦位の食鹽を排出する。隨つて食鹽を必要とする量は一〇乃至二〇瓦、ナトリウムとしては三乃至六瓦が適當である。食物を構成する食品の種類や勤勞の程度によつては多少加減すべきであるが、自然的環境に於いては不足を起すことはない。カリウムは野菜を常に用ひる日本人の習慣からして不足の心配は殆どない。平均して成人は一日に體重一斤當り〇・〇六瓦、乳兒は〇・〇七瓦必要といはれてゐるが正確な數値は未定である。

カリウムの多い食物では食鹽攝取量の増加を忘れてはならない。

④ビタミン ビタミンを必要とする量も他の栄養素と同様に、攝取者の年齢労作及び食物に含まれる栄養素の種類と量等により一様には論じられない。又人體についての正確な必要量はまだ決定されてゐないが大體成人男子に妥當の一人一日の所要量は次のやうである。

ビタミン A 二乃至三疊(βカロチンとして)

ビタミン B<sub>1</sub> 一五乃至二〇疊

ビタミン B<sub>2</sub>(リボフラビン) 二乃至三疊

ニコチニン酸 一〇乃至一五疊

ビタミン C 五〇乃至七五疊

ビタミン D ○○一疊

妊婦や授乳婦についてみると必要とするエネルギー量の増加に伴ない、ビタミンを必要とする量は普通人より遙かに多い。即ちビタミン A は二倍、ビタミン B<sub>1</sub>

ビタミン C は二、三倍、その他のビタミンも普通人より多いから、この點に留意して食物を攝取する必要がある。また幼兒兒童のやうに成長期にある者も、妊婦と同様の注意を以て攝取せねばならない。

成人が一日に必要とする栄養量

中等度の労作に從事する成人が一日に要する各栄養素の量を示すと次のやうになる。

総熱量	二四〇〇カロリー	ビタミン A	二乃至三疊(βカロチンとして)
炭水化物	四五〇瓦	ビタミン B <sub>1</sub>	一五乃至二〇疊
脂肪	二五瓦	ビタミン B <sub>2</sub> (リボフラビン)	二乃至三疊
鐵	一二瓦	ニコチニン酸	一〇乃至一五疊
食鹽	一五瓦	ビタミン C	五〇乃至七〇疊
蛋白質	八〇瓦	ビタミン D	○○一疊
石灰	〇・七瓦		
鈣			

## 第六章 獻 立

○食品の選擇 日常食用に供してゐる食品の種類は夥しい數に上り、しかもこれらはいづれもそれぞれ特有の形態・成分・風味をもち、また特異の經濟的價値を有してゐる。それ故献立をつくるに當つては、まづそれらの特徴を熟知しておくことが大切である。


穀類 米麥類及びこれらとともに混食に供する稗粟・玉蜀黍・黍等の穀類は、わが國に於ける最も重要な食品である。而してその組成性状は大體類似してをり、乾燥してゐるものは種類の如何にかかはらず約一〇乃至一四%の水分を含んでゐる。

穀類は一般に七乃至一二%内外の蛋白質を含んでゐる。小麥・裸麥・粟・黍は約一二%、米は約七%、玉蜀黍はその中間にある。かやうに蛋白質含有量は著しく多いとはいへず、またその栄養價は動物性蛋白質に比較してやや低いのであるが、われわれは、日常穀類を主食としてゐる關係上、これから攝取する蛋白質の實量は、他の食品から攝取するものより遙かに多いのである。

穀類の最も特徴とするところは炭水化物に富むことである。大體六五乃至八〇%を含んでゐる。蛋白質含有量の多い裸麥・小麥類に少く、米に多い。随つて米を主食とするわが國民は自然炭水化物の攝取が多く、それによつて生ずる熱量は一日に攝取する熱量の八〇%を超えることも珍らしくない。

これらの穀類はそのままでは一二%精耕したるものでは〇五%内外の無機質を含有してゐる。これらの無機質は燐・カリウム・マグネシウムに富み、鹽素・カルシウム及びナトリウムは比較的少量である。マグネシウムの多量とカルシウムの僅少とは、主食に供する穀類としての缺陷ではあるが、蛋白質と同様實量に於いては穀類からのカルシウム攝取量が他の食品よりの攝取量を凌駕する場合もある。

穀類はビタミンB<sub>1</sub>及びEに富んでゐるが、他のビタミンは不足してゐるかこれを缺いてゐる。ただ黄色玉蜀黍のみはビタミンAの母體クリプトキサンチンを含んでおり、これが他と異なつてゐる。また穀類に含まれてゐるビタミンB<sub>6</sub>は精



Approved by Ministry of Education  
(Date Jun. 6, 1946)

昭和廿一年六月十一日  
文部省検査済  
翻刻發行者  
師範學校教科書株式會社  
代表者 萩原下松衛平

昭和廿一年六月十六日  
印 刷 者  
東京都京橋區入舟町一丁目十一番地  
電 集  
新井修平

定價金壹圓拾錢  
師範育兒保健 本科用卷一  
發 行 所  
東京都神田區錦町一丁目十六番地  
師範學校教科書株式會社